

四庫全書

子部

欽定四庫全書

鍼灸資生經卷二

鍼灸須藥

千金云病有須鍼者即鍼刺以補瀉之不宜鍼者直
爾灸之然灸之大法其孔穴與鍼無忌即下白鍼或
溫鍼訖乃灸之此為良醫其脚氣一病最宜鍼若鍼
而不灸灸而不鍼非良醫也鍼灸而藥藥不鍼灸亦
非良醫也但恨下里間知鍼者鮮爾所以學者須解

用鍼燔鍼白鍼皆須妙解知鍼知藥固是良醫此言
鍼灸與藥之相須也今人或但知鍼而不灸灸而不
鍼或惟用藥而不知鍼灸者皆犯孫真人所戒也而
世所謂醫者則但知有藥而已鍼灸則未嘗過而問
焉人或詰之則曰是外科也業貴精不貴雜也否則
曰富貴之家未必肯鍼灸也皆自文其過爾吾故詳
著千金之說以示人云

鍼忌

千金云夫用鍼者先明其孔穴補虛瀉實而失其理
鍼毛皮腠理勿傷肌肉鍼肌肉勿傷筋脉鍼筋脉勿
傷骨髓鍼骨髓勿傷諸絡傷筋膜者愕視失魂傷血
脉者煩亂失神傷皮毛者上氣失魄傷骨髓者呻吟
失志傷肌肉者四支不收失智此為五亂因鍼所生
若更失度有死之憂也 素問亦云刺骨無傷筋刺
筋無傷肉刺肉無傷脉刺脉無傷皮刺皮無傷肉刺
肉無傷筋刺筋無傷骨刺中心一日死中肝五日死

中腎六日死中肺三日死中脾十日死中膽一日半

死刺跗上中大脉血出不止死刺頭中腦戶入腦立

死

又無刺大醉大怒大勞大飢大渴大驚新飽云云詳見素問

孔穴相去

甲乙經云自大椎下至尾骶骨二十一椎長三尺折
量取俞穴或云第一椎上更有大椎在宛宛陷中非
有骨也有骨處即是第一椎若以大椎至尾骶二十
一椎長三尺法校之則上節云椎每傾一寸四分惟

第七椎下至於脊骨多分之七故上七節共九寸八分分之七下節十四椎每椎一寸四分分之五有奇故下七節共二尺一分分之三此亦是一說也但第一椎有骨乃骨節之收大椎雖無骨實是穴名既曰自大椎下至十一椎豈可不量大椎以下或者之說於是不通矣

自蔽骨下至臍八寸而中管居其中

上下各四十

氣穴論

注云中管居心蔽骨與臍之中是也按明堂下經云

鳩尾在臆前蔽骨下五分人無蔽骨者從歧骨際下行一寸則是欲定中管之中又當詳有蔽骨無蔽骨

也

當準人長短肥瘠量

自臍下寸半為氣海三寸為丹田至屈

骨凡五寸千金云屈骨在臍下五寸明堂下經亦云

屈骨在橫骨上中極下一寸當準人長短肥瘠量之

銅人云幽門夾巨闕旁各五分肓俞夾臍各五分

明堂

云在巨闕旁各寸半通谷夾上管旁相去三寸

不容在幽門旁各寸半天樞

去肓俞寸半夾臍期門在不容旁寸半大橫直臍旁

不容天樞期門既各寸半
則幽門育俞各五分誤矣
銅人云腎俞在十四椎下
兩旁各寸半與臍平育門在十三椎下相去各三寸
與鳩尾相直腎俞既與臍平育門乃與鳩尾相直亦
可疑也

甲乙經云人有長七尺五寸者髮以下至頤一尺結
喉至髑髀^{鳩尾也}一尺三寸髑髀至天樞八寸天樞至

橫骨六寸半橫骨至內輔上廉一尺八寸內輔上廉
至下廉三寸半內輔下廉至內踝一尺三寸內踝至

地三寸又膝臑至跗屬一尺六寸跗屬至地三寸又
肩至肘一尺七寸肘至腕一尺二寸半腕至中指本
節四寸本節至末四寸半

定髮際

明堂上經云如後髮際亦有項脚長者其毛直至骨
頭亦有無項脚者毛齊至天牖穴即無毛根如何取
穴答曰其毛不可輒定大約如此若的的定中府正
相當即是側相去各二寸此為定穴

下云兩眉中直
上三寸為髮際

後大椎直上
三寸為髮際

論同身寸

下經曰岐伯以八分為一寸緣人有長短肥瘠不同
取穴不準扁鵲以手中指第一節為一寸緣人有身
長手短身短手長取穴亦不準孫真人取大拇指節
橫文為一寸亦有差互今取男左女右手手中指第二
節內庭兩橫文相去為一寸
若屈指即旁取指則中
節上下兩文角角相去
遠近為一寸
謂同身寸
自依此寸法與人著灸療病多愈今以

為準銅人亦曰取中指內文為一寸素問云同身寸是也又多用繩度量繩多出縮不準今以薄竹片點量分寸療病準的亦有用蠟紙條量者但薄篋易折蠟紙亦粘手難取稻稈心量却易為勝於用繩之信縮也

審方書

經云爪甲與爪甲角內與外間內側與外側與夫陷中宛宛中要精審如某穴去某處幾寸與其穴去處

同者自各有經絡

灸膏肓云其間當有四肋三間灸中間者謂四肋必有三間當中間灸不灸邊兩間也

千金曰經云橫三間寸者則是三灸兩間一寸有三灸灸有三分三壯之處即為一寸也

又曰凡量一夫之法覆手并舒四指對度四指上下節橫過為一夫夫有兩種有三指為一夫者若灸腳弱以四指為一夫也

見脚氣

穴名同異

手有三里五里足亦有三里五里手有上廉下廉足
亦有上廉下廉側頭部有竅陰足少陽亦有竅陰偃
伏部有臨泣足少陽亦有臨泣既有五里矣勞宮亦
名五里既有光明矣攢竹亦名光明肩有肩井又有
所謂中肩井足有崑崙又有所謂下崑崙太淵太泉
之名或殊天鼎天頂之字有異丹田初非石門和竅
明堂上經亦非禾膠陽蹻實為申脉本非附陽陰蹻
誤作和字

實為照海本非交信有髑之名扁骨見於外臺懸鍾
之名絕骨童子膠之名前關見於千金注如此者衆
可不審處而鍼灸耶苟不審處則差之毫釐有尋丈
之謬矣於是舉其畧以示世醫俾之謹於求穴云

點穴

千金云人有老少體有長短膚有肥瘦皆須精思商
量準而折之又以肌肉文理節解縫會宛陷之中及
以手按之病者快然如此子細安詳用心者乃能得

之耳許希亦云或身短而手長或手長而身短或胃
腹短或胃腹長或瘠或肥又不可以一槩論也

千金云凡點灸法皆須平直四體無使傾側灸時恐
穴不正徒破好肉爾

明堂云須得身體平直四支無
令拳縮坐點無令俛仰立點無

令傾側若坐點則坐灸卧點則卧灸立點則立灸反此
則不得其穴

千金云凡灸當先陽後陰言從頭向左而漸下次後
從頭向右而漸下先上後下

明堂下云先灸於上後灸於下先灸於少後灸於多皆宜審之

論壯數多

千金云凡言壯數者若丁壯病根深篤可倍於方數

老少羸弱可減半

又云小兒七日以上周年以還不過七壯炷如雀屎

扁鵲灸

法有至五百壯千壯曹氏灸法有百壯有五十壯小品諸方亦然惟明堂本經多云鍼入六分灸三壯更無餘論故後人不準惟以病之輕重而增損之凡灸

頭頂止於七壯積至七七壯止

銅人

若治風則灸上星

前項百會皆至二百壯腹背宜灸五百壯若鳩尾巨

闕亦不宜多四支但去風邪不宜多灸灸多則四支

細而無力

明上

而千金於足三里穴乃云多至三二百

壯心俞禁灸若中風則急灸至百壯皆視其病之輕

重而用之不可泥一說而又不知其有一說也下經

只云若是禁穴明堂亦許灸一壯至三壯恐未盡也

千金云凡官遊吳蜀體上常須三兩處灸之切令瘡

暫差則瘴癘溫瘧毒氣不能著人故吳蜀多行灸法
有阿是之法言人有病即令捏其上若裏當其處不
問孔穴即得便快成痛處即云阿是灸刺皆驗故曰
阿是穴

艾炷大小

千金云黃帝曰灸不三分是謂徒冤炷務大也小弱
乃小作之

又云小兒七日以上周年
以還不過七壯炷如雀糞

明堂下經云凡

灸欲艾炷根下廣三分若不三分即火氣不能遠達

病未能愈則是艾炷欲其大惟頭與四支欲小爾至
明堂上經乃云艾炷依小竹筍頭作其病脉麤細狀
如細線但令當脉灸之雀糞大炷亦能愈疾又有一
途如腹內疝瘕瘕癖塊伏梁氣等惟須大艾炷故小
品曰腹背爛燒四支則但去風邪而已如巨闕鳩尾
雖是胃腹穴灸之不過四七炷祇依竹筍頭大但令
正當脉灸之艾炷若大復灸多其人永無心力如頭
上灸多令人失精神臂脚灸多令人血脉枯渴四支

細而無力既失精神又加於細即令人短壽

見承此漿穴

論甚當故備著之

點艾火

下經云古來灸病忌松栢枳橘榆棗桑竹八木切宜避之有火珠曜日以艾承之得火次有火鏡耀日亦以艾引得火此火皆良諸蕃部落用鑛鐵擊碯石得火出以艾引之凡人卒難備即不如無木火清麻油點燈燈上燒艾莖點灸是也兼滋潤灸瘡至愈不疼

痛用蠟燭更佳

良方云凡取火者宜敲石取火

今舟行人以鐵鉋刀擊石穴以紙灰為火

丸在下承之亦得火或水精鏡於日得太陽火為妙天陰則以

槐木取火

治灸瘡

下經云凡著艾得瘡發所患即差不得瘡發其疾不愈甲乙經云灸瘡不發者用故履底灸令熱熨之三
日即發今用赤皮蔥三五莖去青於燂火中煨熟拍

破熱熨瘡十餘遍其瘡三日自發予見人灸不發者
頻用生麻油清之而發亦有用皂角煎湯候冷頻點
之而發亦有恐氣血衰不發於灸前後煎四物湯服
以此湯滋養氣血故也蓋不可一槩論也予嘗灸三
里各七壯數日過不發再灸兩壯右足發左足不
發更灸左足一壯遂發兩月亦在人以知取之若任
其自然則終不發矣此人事所以當盡也

凡著灸住火使用赤皮葱薄荷煎湯溫洗瘡周回約

一二尺令驅逐風氣於瘡口出兼令經脉往來不滯

自然瘡壞疾愈

今人亦有恐水
殺人不用湯淋

若灸瘡退火痂後用

東南桃枝青嫩柳皮煎湯溫洗能護瘡中諸風若瘡

內黑爛加胡荽煎若瘡疼不可忍多時不效加黃連

煎神效

凡貼灸瘡春用柳絮夏用竹膜秋用新綿冬用兔腹
上白細毛貓兒腹毛更佳今人多以膏藥貼之日三
兩易全不疼但以膏藥貼則易乾爾若要膿出多而

疾除不貼膏藥尤佳

忌食物

既灸忌猪魚熱麵生酒動風冷物雞肉最毒而房勞尤當忌也

下經云灸時不得傷飽大飢飲酒食生硬物兼忌思慮憂愁恚怒呼罵呼嗟歎息等

今下里人灸後亦忌飲水將水濯手足

避人神等

千金云欲行鍼灸先知行年宜忌及人神所在不與

禁忌相應即可故男忌除女忌破男忌戊女忌己有
日神忌有每月忌有十二時忌有四季人神有十二
部人神有十二部年人神有九部旁通人神有雜忌
旁通又有所謂血支血忌之類凡醫者不能知此避
忌若逢病人厄會男女氣怯下手至困通人達士豈
拘此哉若遇急卒暴患不拘此法許希亦云若人病
卒暴宜急療亦不拘此故後之醫者亦云卒暴之疾
須速灸療一日之間止忌一時是也

千金云癰疽疔腫喉痺客忤尤為急凡作湯藥不可
避凶日覺病須臾即宜便治又曰凡人卒暴得風或
中時氣凡百所苦須急救療漸久後皆難愈此論甚
當夫急難之際命在須臾必待吉日後治已淪於鬼
錄矣此所以不可拘避忌也惟平居治病於未形選
天德月德等日服藥鍼灸可也

相天時

千金云日正午以後乃可灸謂陰氣未至灸無不著

午前平旦穀氣虛令人癰眩不可鍼灸卒急者不用此例

下經云灸時若遇陰霧大風雪猛雨炎暑雷電虹霓暫停候晴明即再灸急難亦不拘此

鍼灸資生經卷二

欽定四庫全書

鍼灸資生經卷三

虛損

腦虛冷腦衄風寒入腦久遠頭疼等疾宜灸顙會

予年踰壯洎寒夜觀書每覺腦冷飲酒過量腦亦疼甚後因灸此穴而愈有兵士患鼻衄不已予教令灸此穴即愈有人久患頭風亦令灸此穴即愈但銅人明堂經只云主鼻塞不聞香臭等疾而已故予書此

以補其治療之闕然以腦戶不宜鍼觀之顙會亦不宜鍼經止云八歲以下不宜鍼恐未盡也

凡飲食不消心腹膨脹面色萎黃世謂之脾腎病者宜灸中腕

諸葛亮夙興夜寐罰至二十皆親覽而所噉食不至數升司馬仲達知其將死既而亮卒仲達追之楊儀反旗鳴鼓若將拒焉仲達乃退不敢逼百姓為之諺曰死諸葛走生仲達仲達聞之曰吾便料生不便料

死故也其曰料生蓋料其事多而食不如前死之兆也食不如前仲達且知諸葛之且死今人飲食減少是胃氣將絕不可久生矣方且常食堅硬使愈難剋化服峻補藥使脾胃反熱愈不能食初不知灸中脘等穴以壯脾胃亦惑之甚也

難經論四時皆以胃氣為本釋者日言三臟皆

以胃氣為本胃者水穀之府人須仰胃氣為生也然則欲全生者宜灸胃脘

久冷傷億藏府洩利不止中風不省人事等疾宜灸神

闕

舊傳有人年老而願如童子者蓋每歲以鼠糞灸臍中一壯故也予嘗久患溏利一夕灸三七壯則次日不如廁連數夕灸則數日不如廁足見經言主洩利不止之驗也又予年踰壯覺左手足無力偶灸此而愈後見同官說中風人多灸此或百壯或三百壯皆愈而經不言主中風何也

藏氣虛憊真氣不足一切氣疾久不差者宜灸氣海

銅

人身有四海氣海血海照海髓海是也而氣海為第

一氣海者元氣之海也人以元氣為本元氣不傷雖疾不害一傷元氣無疾而死矣宜頻灸此穴以壯元陽若必待疾作而後灸恐失之晚也

府藏虛乏下元冷憊等疾宜灸丹田

人有常言七七之數是旁太歲壓本命六十有一是太歲壓本命人值此年多有不能必者是固然矣然傳不云吉人吉其凶者乎常觀素問以六八之數為

精髓竭之年是當節其欲矣

千金云五十者一月一泄要之四十八便當依

此千金載素女論六十者閉精勿泄是欲當絕矣宜

節不知節宜絕不能絕坐此而喪生蓋自取之豈歲

之罪哉人無罪歲則雖有孽猶可違矣所謂吉其凶

者如此雖不灸丹田可也

丹田可灸七七壯或三百壯

陽氣虛億失精絕子宜灸中極

中極一名氣原蓋氣之原也人之陽氣虛億者可不

灸此以實其氣耶

按難經云丹田亦名大中極言丹田取人之身上下四旁最為中間

也故名為極此亦曰中極其去丹田只一寸雖未若丹田之最中然不中不遠矣

三里治胃寒心腹脹滿胃氣不足惡聞食臭腸鳴腹痛

食不化

銅

秦承祖云諸病皆治

華佗云療五勞羸瘦

七傷虛乏胃中瘀血乳癰外臺

明堂云人年三十以

上若不灸三里令氣上衝

明下云
目暗

千云主陰氣不足

小腹堅熱病汗不出口苦壯熱身反折口噤腰痛不可

顧胃氣不足久泄利食不化脇下注滿不能久立狂言

狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽悽惡寒云云

凡此等疾皆刺灸之多至五百壯少至二三百壯

小品云四支但去風邪不宜多灸七壯至七七壯止
不得過隨年數故銅人於三里穴止云灸三壯鍼五
分而已明堂上經乃云日灸七壯止百壯亦未為多
也至千金方則云多至五百壯少至二三百壯何其
多耶要之日灸七壯或艾炷甚小可至二七壯數日
灸至七七壯止灸瘡既乾則又報灸之以合乎若要
安丹田三里不曾乾之說可也必如千金之壯數恐
犯小品之所戒也予舊有腳氣疾遇春則足稍腫夏

中尤甚至冬腫漸消偶夏間依素問注所說穴之所
在以溫鍼微刺之翌日腫消其神效有如此者謬刺
且爾況於灸乎有此疾者不可不知此不止治足腫
諸疾皆治云

涌泉治心痛不嗜食婦人無子男子如蠱女子如妊娠

千作
如阻

五指端盡痛足不得履地宜針灸

銅

千云主忽忽

喜忘身體腰脊如解大便難小便不利足中清至膝咽
中痛不可內食瘡不能言衄不止云云

千金於諸穴皆分主之獨於膏肓三里涌泉穴特云
治雜病是三穴者無所不治也但明堂云若灸廢人
行動爾既欲愈疾雖不行動數日未為害也

脾俞治食多身瘦洩利體重四支不收腹痛不嗜食

銅

胃俞治胃寒腹脹不嗜食羸瘦

銅

人之言曰血氣未動者瘠甚而不害血氣既竭者雖
肥而死矣則身之羸瘦若未足為人之害者殊不知
人之羸瘦必其飲食不進者也飲食不進則無以生

榮衛榮衛無以生則氣血因之以衰終於必亡而已
故難經疏云人仰胃氣為主是人資胃氣以生矣五
藏論云脾不磨食不消是脾不壯食無自而消矣既
資胃氣以生又資脾以消食其可使脾胃一日不壯
哉必欲脾胃之壯當灸脾胃俞等穴可也

心中風狂走發癇語悲泣心胃悶亂欬唾血宜針心俞

銅

難經疏言心為藏府之主法不受病病則神去氣竭

故手足為之清

手足節冷

名真心痛旦發夕死手足溫者

名厥心痛可急治也故千金言心中風者急灸心俞
百壯服續命湯必泥心俞不可灸之說則無策矣但
心俞雖可鍼若刺中心一日必死又豈易鍼耶必欲
無此患平居當養其心使之和平憂愁思慮不使傷
其神乃策之上必不免此亦當服鎮心丹等藥補助
乃其次也

腎俞治虛勞羸瘦腎虛水藏久冷小便濁出精陰中疼
五勞七傷虛憊足寒如冰身腫如水

銅

難經疏云夾脊骨有二腎在左為腎在右為命門言
命門者性命之根本也其穴與臍平凡灸腎俞者在
平處立以杖子約量至臍又以此杖子當背脊骨上
量之知是與臍平處也然後相去各寸半取其穴則
是腎俞穴也更以手按其陷中而後灸之則不失穴
所在矣凡灸以隨年為壯灸固有功亦在人滋養之
如何爾人當愛護丹田吾既於既效方論之詳矣而
妻妾之戕害蓋未之及也君子偕老之序曰夫人淫

亂失事君子之道故陳人君之德服飾之盛宜與君子偕老也宜偕老而不至偕老夫人之罪多矣故詩人以是刺之意可見也至於士夫志得意滿不期驕而驕至侍妾數十人少亦三五輩淫言褻語不絕于耳不能自克而淫縱其欲者多矣為內子者恬不之怪人有問之者則曰自母言之則為賢母自我言之未免為妬婦人也人或以此多之其夫亦以為賢而不妬孰知其不妬乃所以為禍之歟雖然二南之化

至於無妬忌而止今而言此豈求異於詩人耶是不
然古人十日一御荀子彼其不妬者蓋使媵妾得備
十日一御之數爾不妬則同所以不妬則異吾故表
而出之以為夫婦之戒固非求異於詩人也

曲骨主失精五藏虛竭灸五十壯千明下云但是虛乏

冷極皆宜灸

骨髓冷疼灸上廉七十壯千

難經疏八會曰府會中管治府之病藏會章門藏病

治此筋會陽陵泉筋病治此髓會絕骨髓病治此血
會髀俞血病治此骨會大杼禁灸骨病治此脉會太淵
脉病治此氣會亶中氣病治此然則骨髓有病當先
大杼絕骨而後上廉可也

膀胱三焦津液少大小腸寒熱見腰痛或三焦寒熱灸小

腸俞五十壯千三焦膀胱腎中熱氣灸水道隨年千

膏肓俞主無所不療羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆發
狂健忘等疾

膏肓俞無所不療而古人不能求其穴是以晉景公
有疾秦醫曰緩者視之曰在肓之上膏之下攻之不
可達之不及藥不至焉不可為也晉侯以為良醫而
孫真人乃笑其拙為不能尋其穴而灸之也若李子
豫之赤龍丹又能治其膏肓上五音下之鬼無待於
灸也是緩非特拙於不能灸亦無殺鬼藥矣其亦技
止於此哉

灸二十種骨蒸

崔知悌序云骨蒸病者亦名傳尸亦謂殭殍亦稱復連亦曰無辜丈夫以精氣為根女人以血氣為本無問老少多染此疾予嘗三十日灸活十三人前後差者數踰二百非止單攻骨蒸又別療氣療風或瘴或勞或邪或癖病狀既廣灸活者不可具錄灸後宜服治勞地黃元良

凡取四花穴以稻稈心量口縫如何闊斷其長多少以如此長裁紙四方當中剪小孔別用長稻稈踏脚

下前取脚大指為止後取脚曲踖橫文中為止斷了
却環在結喉下垂向背後看稭止處即以前小孔紙
當中安分為四花蓋灸紙四角也又一醫傳一法先
橫量口吻取長短以所量草就背上三推骨下直量
至草盡處兩頭用筆點了再量中指長短為準却將
量中指草橫直量兩頭用筆圈四角其圈者是穴
不是可灸七七壯止

勞瘵 傳尸 骨蒸 羸瘦

中髒治丈夫五勞七傷六極腰痛大便難小便淋瀝腹

脹下利食洩

銅

三里治五勞羸瘦七傷虛乏 明下云

五勞虛乏四支羸瘦 肩井治五勞七傷 大椎治五

勞七傷溫瘧瘵瘧氣瘵背膊急頸項強

明上下同

風勞食氣

肺俞治寒熱喘滿虛煩口乾傳尸骨蒸勞肺痿欬嗽

明云療肉痛皮癢傳尸骨蒸肺嗽魄戶治虛勞肺

痿

明云勞損痿黃

五尸走疰項強明下云療勞損虛乏 秦承

祖云支正療五勞四支力弱虛乏等

明下

譙譙療勞損虛

乏不得睡 下焦俞療背痛身熱 曲骨但是虛乏冷

極皆灸 氣海療冷病面黑肌體羸瘦四支力弱小腹

氣積聚責豚腹弱脫陽欲死不知人五藏氣逆上攻

膏肓俞治羸瘦虛損夢中失精無所不療銅 腎俞治虛

勞羸瘦耳聾腎虛水藏久冷明有腰痛 心腹膨脹脅滿引小

腹痛目視眈眈少氣溺血小便濁出精陰疼五勞七傷

虛憊脚膝拘急明有好獨卧 足寒如冰頭重身熱振慄腰中

四支淫灤洞洩食不化身腫如水 明下云療身寒熱

食多身羸瘦面黃黑目眊眊女久積冷氣成勞腦空

治勞疾羸瘦體熱頸項強章門治傷飽身黃羸瘦

漏谷治食不為肌膚

下管治日漸羸瘦

見瘕

下管見腹

脹

胃俞

見虛損

脾俞

下廉

見瘕

治羸瘦小兒羸瘦食飲

少不生肌膚灸胃俞一壯

明下

灸勞法其手足心熱多盜汗精神困頓骨節疼寒初

發咳嗽漸吐膿血肌瘦面黃減食少力令身正直用草

子男左女右自脚中指尖量過脚心下向上至曲踞大

紋處截斷却將此草自鼻尖量從頭正中

須分開頭心
髮貼肉量

至脊以草盡處用墨點記別用草一條令病人自然合

口量闊狹截斷却將此草於墨點上平摺兩頭盡處量

穴灸時隨年多灸一壯

如年三十
灸三十一
累効集

羸瘦固瘵疾自有寒熱等證宜隨證醫治若素來清

癯者非有疾也惟病後瘦甚久不復常謂之形脫與

夫平昔充肥忽爾羸瘦飲食減少者或有他疾乘之

則難救療須辨之於早而著艾可也然仲景論六極

必曰精極令人氣少無力漸漸內虛身無潤澤翕翕
羸瘦眼無精光且云八味腎氣差六極而差五勞則
是八味丸所當服仲景常服或常服去附子加五味子而腎俞等穴尤
所當灸也

脾俞大腸俞主腹中氣脹引脊痛食多身羸瘦名曰食
晦先取脾俞後取季肋五藏六府心腹滿腰背痛飲
食吐逆寒熱往來小便不利羸瘦少氣灸三焦俞隨年
千

腎虛

腎俞治腎虛水藏久冷

銅見勞明同

中膂俞治腎虛消渴

見竭

陽蹻療腎氣

明

下廉療小腸氣不足面無顏色灸小腸

氣瘕癖氣發時腹痛苦刀刺不可忍者并婦女本藏氣

血癖走疰刺痛或坐卧不得或大小便不通可思飲食

於左右脚下第二指第一節曲紋中心各灸十壯每

壯如赤豆大甚驗

集効 一云治寒病腎腸氣發牽連外腎大痛腫硬如石

治小腸氣方甚多未必皆效老胃域方奪命散良方倉

猝散皆已試之效者有一兵患小腸氣依此方灸足
第二指下文五壯畧效而再發恐壯數未多也予以
鎮靈丹十粒與之令早晚服五粒而愈灸固捷於藥
若灸不得穴又不如藥相當者見效之速且灸且藥
方為當爾 近傳一立聖散用全乾蝎七枚縮砂仁
三七枚炒茴香一錢為末分三服熱酒調下和滓空
心服此疾是小腸受熱蘊積不散久而成疾服此立
效雖未試用以其說有理故附于此有士人年少覓

灸夢遺為點腎俞痠疼其令灸而愈則不拘老少腎
皆虛也古人云百病皆生于心又云百病皆生于腎
心勞生百病人皆知之腎虛亦生百病人未知也蓋
天一生水地二生火腎水不上升則心火不下降茲
病所由生也人不可不養心不愛護腎乎

消渴

消腎

消中

商丘主煩主渴

干

意舍主消渴身熱面目黃

明同

承漿

明下

云飲水
不休

意舍關衝

然谷主消渴嗜飲

隱白主飲渴

勞宮主苦渴食不下 曲池主寒熱渴 行間 太

衝主噎乾善渴

並

意舍

見腹

中膺俞治腎虛消渴汗不

出

明作汗出

腰脊不得俛仰腹脹脇痛

銅

兌端治小便黃舌

乾消渴

然谷治舌縱煩滿消渴

水溝治消渴飲水

無度

明同

陽綱療消渴

明下見腸鳴

古方載渴病有三曰消渴曰消中曰消腎消腎最忌

房事李祠部必云腎虛則消渴消中亦當忌也張仲

景云宜服八味丸或服之不效者不去附子也有同

舍患此人教服去附子加五味子八味丸即效有同

官患此子教服千金枸杞湯效坡文載眉山張醫治

楊穎臣渴病

見坡

麝香當門子酒漬作十九取枳枸

俗謂

雞距子亦曰癰漢指頭

作湯飲之愈張云消渴消中皆脾衰而

腎敗土不能勝水腎液不上汧乃成此疾今診楊脾

極巨脉熱而腎衰當由果實過度虛熱在脾故飲食

兼人而多飲水水多故溺多非消渴也麝香能敗酒

瓜果近輒不植屋外有枳枸木屋中釀酒不熟故以

二物去酒果毒其論渴有理故載于此

凡消渴經百日以上不得灸刺灸刺則於瘡上漏膿水
不歇遂致癰疽羸瘦而死亦忌有所誤傷初得患者可

如方刺灸若灸諸陰而不愈宜灸諸陽

詳見千金
有數十穴

陰痿縮 兩丸騫

陰谷主陰痿小腹急引陰內廉痛

十

大赫 然谷主精

溢上縮 太衝主兩丸騫縮腹堅不得卧

甲云臍環痛
陰騫兩丸縮

石門主小腹堅痛下引陰中不得小便兩丸騫 陰交

主腹臙堅痛引陰中不得小便兩丸騫陰縮灸中封

大赫

精見失

中封主痿厥

見症

曲泉主不尿陰痿

氣衝治陰痿莖痛

千同

兩丸騫痛不可忍

銅

五樞

見症

歸來治卵縮

見陰痛

筋攣陰縮入腹相引痛灸中封五十壯或不滿五十壯
老少加減又云此二穴喉腫厥逆五藏所苦鼓脹並主
之

陰挺出

大敦主陰挺出 少府主陰挺長

千並見疝

上膠

千見絕子治

婦人陰挺出不禁

銅

陰蹻

照海

見淋

水泉

見月事

曲

泉

見瘕癖千同

治婦人陰挺出

陰蹻

見淋

療陰挺出

明

轉胞

涌泉主胞轉

千見淋

關元主婦人胞轉不得尿

見無子又主胞

閉塞銅云治胞轉不得尿

腰痛小便不利苦胞轉灸中極七壯

小兒同

又灸十五椎或臍下一寸或四寸隨年 凡飽食訖忍小

便或走馬或忍小便入房或大走皆致胞轉臍下急滿

不通

方見千金

凡尿不在胞囊中為胞屈僻津液不通葱

葉除尖頭內陰莖孔中深三寸微用口吹胞脹津通愈

陰莖疼

曲泉

見症

行間主癰閉莖中痛

千

氣衝主陰痿莖痛

烈缺

見失精

陰陵泉

少府主陰痛

歸來主賁豚

卵上入引莖痛

歸來治小腹賁豚卵縮莖痛

銅

橫

骨治陰器縱伸痛

見淋

水道治小腹滿引陰痛

見小腹滿

氣衝治莖痛

見陰痿

會陰治陰中諸病前後相引痛不

得大小便陰端寒衝心

大敦治陰頭痛

見症

腎俞

見勞

志室

見陰腫

陰谷

見溺難

太衝

見小便不利

治陰痛

千金翼云七傷為病小便赤熱乍數時難或時傷多

或如鍼刺陰下常濕陰痿消小精清而少連連獨洩

陰端寒冷莖中疼痛云云

當早服藥著艾

莖中痛灸行間三

十壯

膀胱氣

章門療膀胱氣癖疝瘕氣膀胱氣痛狀如雷聲積聚氣

明岐伯灸膀胱氣攻衝兩脇時臍下鳴陰卵入腹灸臍

下六寸兩旁各寸六分三七壯五樞療膀胱氣攻兩

脇下膀胱冷灸之如腎虛法千膀胱三焦津液少大小

腸寒熱見腰痛或三焦寒熱灸小腸俞五十壯三焦膀

胱腎中熱氣灸水道隨年壯水道治小腹滿引陰中

痛腰背急膀胱有寒三焦結熱小便不利

千金云氣衝主癰明堂云氣衝療瘡疔是瘡疔即癰

也必用云治水癰偏大上下不定疼不可忍俗呼為

膀胱氣是膀胱氣即癰疽也然太倉公診命婦云疽
氣客于膀胱難于前後洩而溺赤又不可便認膀胱
氣為疽氣云

陰汗 濕癢

會陽治陽氣虛乏陰汗濕

銅

魚際

見寒熱

療陰汗

明

千云

主陰濕腹中餘疾 中極 陰蹻 腰尻交 陰交

曲泉主陰癢

千

會陰主陰頭寒

少府主陰癢

見症

仲景論七傷曰一陰汗二精寒三精清四精少五囊

下濕癢六小便數七夜夢陰人然則陰汗陰濕癢者

蓋七傷之數也可不早治之乎

有人作文字則氣濕亦心氣使然心腎相

為表裏故也

千金翼敘虛損云疾之所起生自五勞即生六極

詳見

寒熱復生七傷一陰寒二陰痿三裏急四精連連不絕

五精少囊濕六精清七小便數

其病小便赤熱或如鍼刺陰痿小陰下常

濕精清而少云云論與仲景少異故載之於此

陰腫 陰瘡

曲泉

見無子

陰蹻

見漏下

大敦

氣衝

見症

主陰腫

千志

室胞育療陰痛下腫

明

崑崙在外踝後跟骨上治陰腫

銅

明

下云內崑崙在內踝後五分筋骨間療小兒陰腫灸三

壯

曲泉治陰腫骭痛

見風勞

氣衝治婦人陰腫

見月事

又

療陰腫

明下見症

膀胱俞治陰生瘡

見便赤

有人陰腫醫以赤土塗之令服八味丸而愈一小兒

陰腫醫亦以赤土塗之愈

今人用寫字油柱木用

若久病而陰

腫病已不可救宜速灸水分穴蓋水分能分水穀水

穀不分故陰腫不特陰腫他處亦腫也尤宜急服禹

餘糧丸云

見既效方

小腹痛

陰蹻療小腹偏痛嘔逆嗜卧

明

中極療小腹痛積聚堅

如石小便不利失精絕子面黧

下

腎俞復溜中封

承筋陰包承山大敦主小腹痛

千

石門商丘

主小腹堅痛下引陰中石門水分主小腹痛拘急痛

涌泉主風入腹中小腹痛臍中等主小腹痛氣痛

見症

大谿主小腹熱而偏痛

肝俞是欬逆

小腸俞見便赤

蠱溝

照海

見症

下廉

見陰洩

丘墟

見腫脹

中都

見腸鳴

治小腹痛

銅

太衝治腰引小腹痛

帶脉治婦人小腹堅痛月脉不

調帶下赤白裏急瘕瘕

五樞主小腹痛

見症

曲泉主女

子小腹痛

無子

婦人陰痛引心下

小腹綬痛灸膝外邊上去一寸宛宛中千翼

小腹脹滿

大巨治小腹脹滿煩渴癢症偏枯四支不舉

銅

曲骨治

小腹脹滿小便淋瀝不通癢症小腹痛 然谷治小腹

脹

見症

幽門治小腹脹滿嘔沫吐涎喜噦

京門

見腸鳴

蠡溝

見症

中封治小腹腫

見瘡

胞育治小腹堅急

見腹痛

水道治

小腹滿引陰中痛腰背強急膀胱有寒三焦結熱小便

不利大敦治小腹痛中熱喜寐小便不利小腹胀滿

虛乏灸小腸俞隨年

千

五藏虛勞小腹弦急脹熱灸腎

俞五十壯老小損之若虛冷可百壯委中主小腹堅

腫

銅人云小腸俞治小便赤澀淋瀝小腹痛千金亦云

治小腹脹滿此治小腹脹痛要穴也若灸不效方灸
其他穴云

癰疽

諸疽氣

胎疽

寒疽

卒疽

必用方云治水癰偏大上下不定疼不可忍俗呼為
膀胱氣用煨過牡蠣二兩炮乾薑一兩為末塗病處
即愈則是水癰即膀胱氣也千金云氣衝主癰明堂
下經云治癰疽則是癰即癰疽也恐人惑其名而誤
治之故為之辯

曲泉主癰疽陰跳痛引臍中 千 中都 合陽 中郛

關元大巨 交信 中封 太衝 地機主癰疽 中

封主癰疽癰暴痛痿厥 少府主陰痛實時挺長寒熱

陰暴痛遺尿偏虛則暴癢氣逆卒疝小便不利 衝門

主婦人陰疝 商丘主陰股內痛氣癰狐疝走上下引

小腹痛不可俛仰 巨闕主狐疝 太衝主狐疝歐厥

肩井旁肩解與臂相接處主偏癰 氣衝主癰陰腫

痛 中管主衝疝冒死不知人 交信主氣癰癰疽陰

急股樞膊內廉痛 臍中 石門 天樞 氣海主小

腹疝氣遊行五藏疝繞臍衝胃不得息並臍疝繞臍痛

衝胃不得息灸臍中 臍疝繞臍痛石門主之 臍疝

繞臍痛時止天樞主之又主氣疝煩嘔千金主面腫賁

豚並氣衝主癰明下作陰腫痛陰痿莖中痛兩丸騫痛

不可仰卧 五樞主陰疝兩丸上入小腹痛明下云主

陰疝小腹痛 陰交 石門 太衝主兩丸騫見陰交信

淋見中都鳴見腸 大巨 曲骨見小治癰疝銅 曲泉治大

夫癰疽陰股痛小便難腹脅支滿癰閉少氣洩利四支
不舉實即身熱目眩痛汗不出目眈眈膝痛筋攣不可
屈伸千金曰癰有四種腸癰卵脹難灸氣癰水癰鍼灸
易治卵偏大上入腹灸三陰交隨年卵偏大癰病灸關
元百壯或大敦隨年壯或橫骨邊二七壯夾莖是

詳見千金

築賓治小兒胎疝

明下

痛不得乳

小兒胎疝卵偏重

灸囊後縫十字文當上三壯春較夏灸秋較冬灸 太

衝主女子疝及小腹腫澹泄癰遺尿陰痛面黑目眇痛

漏血

千

蠱溝主女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛

陰交 石門主疝

見無子

小兒氣癰灸足厥陰大敦左灸

右灸左各一壯太倉公診司空命婦曰疝氣客于膀胱

難于前後洩而溺赤灸其足蹶陰脉左右各一所即

不遺溺而洩清

更為火齊湯飲之而疝氣散

陰市肝俞療寒疝下至

腰脚如冷水水傷諸疝按之在膝上伏兔下寒痛腹脹

滿厥少氣明下云卒疝小腹痛力痿氣少伏兔中寒腰

如冷水銅云寒疝小腹脹腰以下伏兔上寒如冷水

合陽治寒疝陰偏痛

銅

然谷治寒疝小腹脹上搶胃脇

次膠治疝氣下墜腰脊痛不得轉搖急引陰器痛不

可忍腰下至足不仁背膝寒小便赤淋心下堅脹 大谿

行間

見白濁

育俞

見腹脹

肝俞治寒疝

見欬明同

陰交治寒

疝引小腹痛腰膝拘攣

五樞治男子寒疝卵上入小

腹痛 中封治寒疝引腰中痛或身微熱 大敦主寒

疝陰挺出

見下

舍弟少戲舉重得偏墜之疾有客人為當關元兩旁

相去各三寸青脉上灸七壯即愈王彥賓患小腸氣

亦如此灸之愈

餘見膀胱

金門

見尸厥

丘墟

見腋腫

治暴疝痛

大敦治卒疝小便數

遺溺陰頭中痛心痛汗出陰上入腹陰偏大腹臍中痛

悵悵不樂病左取右病右取左 蠡溝治卒疝小腹腫

時小腹暴痛小便不利如癰閉數噫恐悸少氣不足腹

痛悵悵不樂咽中悶如有息肉背拘急不可俛仰 太

衝治小兒卒疝嘔逆發寒咽乾肘腫內踝前痛淫瀝斷

痠腋下腫 明下云療卒疝小腹痛小便不利如淋

照海治卒疝小腹痛嘔吐嗜卧 陰蹻療卒疝小腹痛

同上左取右右取左立已明 蠡溝療卒疝小股腫小便不

利交儀同 臍下積氣如卵石足寒脛酸屈伸難下 石門療

卒疝繞臍痛 關元療卒銅作暴千同 疝小腹痛轉胞不得

小便 陷谷療卒疝小腹痛 交信見淋 療卒疝 華池

療卒陰卵偏大取足大指去甲五分內側白肉際灸三

壯炷如半棗核左取右右取左 照海主四支淫瀼身

悶陰暴起疝

千

大敦主卒疝暴痛陰跳上入腹寒疝陰

挺出偏大腫臍腹中悵悵不樂小便難而痛灸刺立已

左取右右取左

甲云照海主之

疝瘕

餘見瘕癖

陰陵泉治疝瘕小便不利氣淋

銅

千云主婦人疝瘕按

之如以湯沃股內至腰殮泄陰痛小腹痛堅急下濕不

嗜食

太谿主胞中有大疝瘕積聚與陰相引

千

太陰

郄衝門主疝瘕陰疝

四滿主臍下疝積

甲云胞中有血

石

門主腹滿疝積

四滿

見積聚

中極治疝瘕

府舍治疝

癖

見脾疼

瘕聚灸氣海天樞百壯

並見腹脹

丘墟主大疝腹堅

關元治瘕聚

見赤白帶

帶下灸間使三十又淋小便赤尿

道痛臍下結塊如覆盆或因食得或因產得惡露不下

遂成疝瘕或因月事不調血結成塊皆鍼之

千金翼

淋瘕

淋瀝

餘見小便不通

關元主胞閉塞小便不通勞熱石淋又主石淋臍下三

十六疾不得小便并灸足太陽懸鐘主五淋大敦

氣門主五淋不得尿 氣衝主腹中滿熱淋閉不得

尿 交信主氣淋 復留主血淋 明下云療五淋小

便如散灰色 關元 涌泉主胞轉氣淋 長強 小

腸俞主淋癰 關元 陰陵泉主腎病不可俛仰氣癰

曲泉主癰閉 行間主癰閉莖中痛 然谷主癰疝

曲骨主小腹脹血癰小便難 包肱秩邊主癰閉下

重不得小便 陰蹻主女子淋

明云療諸淋見淋瀝

石門療氣淋

小便黃_下 長強療五淋 曲骨療五淋小便黃 至陰

療小便淋失精

下

中極治五淋小便赤澀

明下又云尿道痛

失精臍下結如覆杯陽氣虛憊

銅

復溜治五淋小便

如散火

次膠治赤淋

見便不利

然谷

曲骨治淋瀝

見小

腹痛

太衝治淋

陰陵泉治氣淋寒熱不節

交信治

氣淋癢疝陰急股引臍內廉骨痛 明云療氣淋卒疝

大小便難

箕門治淋遺溺鼠鼷腫痛小便不通

大

鍾治實則小便淋閉洒洒腰脊強痛大便秘澀嗜卧口

中熱虛則嘔逆多寒欲閉戶而處少氣不足胃脹喘息

舌乾咽中食噎不得下善驚恐不樂喉鳴欬唾血氣淋

灸關元五十壯或鹽著臍中灸三壯千石淋灸關元或

氣門或大敦各三十壯勞淋灸足太陰百壯血淋灸丹

田或伏留各隨年五淋不小便中封二七壯或大敦七

壯

餘見千金

水泉治女小便淋瀝

委陽

志室

見陰痛

中膠治小便淋瀝

陰蹻療婦人淋瀝陰挺出

銅同

四支

淫灤心悶及諸淋

明

關元

明

治不覺遺瀝

銅見臍痛

小

腸俞治淋瀝

見小便赤

予壯年寓學忽有遺泄之患因閱方書見有用五倍
子末酒調服者服之而愈藥若相投豈在多品而亦
無事於灸也故附著于此若欲治淋疾則有王不留
行子神效彭侍郎以治張道士服三粒愈見既效方有婦
人患淋卧病久之服諸藥愈甚其夫入夜來告急予
令取此花葉十餘葉令研細煎服翌朝再來云病已
減八分再與數葉煎服即愈一名剪金花一名金盞銀盞

小便難

不通

不利

涌泉療小便不通

明

曲骨療婦人小便不通

下見帶下

曲泉主陰跳痛引莖中不得尿

十

陰交 石門

委

陽主小腹堅痛引陰中不得小便 關元主三十六疾

不得小便 氣衝主淋閉不得尿 大敦主小便難而

痛

甲云照海主之

橫骨 大巨 期門主小腹滿小便難陰

下縱 陰谷 大敦 箕門 委中 委陽主陰跳遺

小便難 中封 行間主振寒洩白尿難痛 曲骨主

小腹脹血癰小便難 烈缺主小便熱痛 中極等

見失

精

承扶

屈骨端主小便不利

見大便不禁

少府

三

里主小便不利癰

陰陵泉主心下滿寒中小便不利

包育等

見淋

石門

關元

陰交

中極

並見無子

曲

骨

見帶下

主不得小便

京門主溢飲水道不通溺黃

太衝治腰引小便痛小便不利狀如淋

明同

癰疽小腹腫

溇洩遺溺陰痛面目蒼色胃脇支滿足寒大便難

銅

水道治膀胱寒三焦熱小便不利

見小腹痛

會陰治小便

難竅中熱

同

皮痛陰端寒衝心

橫骨治腹脹小便

難陰器縱伸痛

陰包

見腰

至陰

陰陵泉

見症

地機

見水腫

三陰交

見瘕癖

治小便不利

箕門

見淋

治小便不

通 陰谷治煩逆溺難小腹急引陰痛股內廉痛 五

里治腸中滿熱閉不得溺

行間治溺難

見白濁

有人小便淋澁不通甚以為苦予令摘王不留行葉

詳見淋瀝研細煎服即愈

黃耆椎破水煎數沸服治大小便不通立效亦有多煎葱湯浸

臍以下得通

小便五色

腎俞主小便難赤濁骨寒熱十前谷委中主尿赤

難上廉下廉主小便難黃凡尿青取并黃取俞

赤取榮白取經黑取合承漿主小便赤黃或時不禁

完骨小腸俞白環俞陽綱膀胱俞主小便赤

黃中管主小腸有熱尿黃關元主腎病氣癰尿黃

京門又見下不通照海主尿黃水道不通太陵主目赤

小便如血關元主傷中尿血太陵治小便如血

關元明下同治溺海見臍痛下管療小便赤明見腹堅陰交

治臍下熱小便赤氣痛如刀攪作塊如覆杯 陰踠療

尿黃水小腹熱咽乾下云療小便難 小腸俞治小便

赤澁小腸緊急 大谿 關元 見責脉 白環俞療小便

黃 下 小腸俞治小便赤澁淋瀝小腹痛 銅 膀胱俞

治小便赤澁遺溺陰生瘡少氣脛寒拘急不得屈伸

上廉治小便難赤黃 太谿 見傷寒無汗 兌端 見渴 陰谷

見腹脹 下廉治溺黃 冤門治小便赤黃 關元 見臍痛

秩邊 見腰痛 氣海 陽綱治小便赤澁 見腹脹 下皖

治小便赤

見腹痛

大敦主尿血灸三壯

千

小便有五色惟赤白色者多赤色多因酒得之宜服

本事方清心丸

予教人服効

白色乃下元冷宜服補藥著

灸腎俞關元小腸俞膀胱俞等皆要穴也近有患小便出血者人教酒與水煎苦賣菜根服即愈

治夢遺失精

白濁

虛勞尿精灸第七椎兩旁各三十壯

千

或曲泉百壯虛

勞白濁灸脾俞百壯或

三焦俞

腎俞

章門

各

百壯夢失精小便濁難灸腎俞百壯 夢泄精灸中封

五十 男子夢與人交精泄灸三陰穴五十 失精陰

縮灸中封五十 陰痛溺血精出灸列缺俞五十 失

精五藏虛竭灸曲骨端五十 失精陰縮莖痛灸大赫

三十 失精膝脛痛冷灸曲泉百壯 腰脊冷疼溺濁

灸脾募百壯並千 白濁漏精灸大椎骨尾龜骨並中間

共三穴以繩量大椎至尾龜骨折中取中間穴別附 太

衝 中封 地機主精不足千 中極 蠡溝 漏谷

承扶 至陰主小便不利失精

明下同

志室治失精

小便淋瀝

然谷主精溢

大赫同

髀痠不能久立足一寒

一熱

行間治弱難白濁寒疝小腹腫

腎俞治弱血

便濁出精

銅見勞療

膏肓俞治夢失精

見勞

至陰 曲泉

見風勞

中極

明下同

治失精

見淋

志室治下腫失精夢泄

精灸三陰交二七壯夢斷神良

千

虛勞尿精陽陵泉或

陰陵泉隨年壯或十椎十九椎旁三十壯耳聾腰痛失

精食少膝以下清云云當灸京門五十壯十四椎百壯

五藏論曰心有三孔藏精汁三合千則人之遺漏其
因於心乎心動則遺漏從之欲免此患要養其心使
不動可也其次則邪念或起必蚤抑之至游居士云
不愁念起只恐覺遲是也服藥鍼灸斯為下矣然猶
愈於不為也

大便不通

大鍾 中竅 石門 承山 太衝 中管 太谿

承筋主大便難千

崑崙主不得大便 盲俞主大便

乾腹中切痛 石關主大便閉塞氣結心堅滿 承山

見轉筋

太谿

見傷寒無汗

治大便難

銅

大鍾

銅見淋

石關

治大便秘澀

盲俞治大便燥

見腰痛

中注治小腹有

熱大便秘燥不利

太白治腰痛大便難

太衝治足

寒大便秘

石關

膀胱俞療腹痛大便難

明下

大便難

灸七椎旁各一寸七壯

千

又承筋三壯

大便不通

大敦四壯

大便閉塞氣結心堅滿石門百壯

餘見千金

腹中有積大便秘已豆肉為餅置臍中灸三壯即通神

效耆城密允治大便秘

詳見既効

大小便不通

豐隆主大小便澀難

明同

長強

明下同

小腸俞主大小

便難淋瀝

包肓主癰閉下重大小便難

水道主三

焦約大小便不通

又云主婦人

營衝四穴主大小便不利

太谿主大便難尿黃中注浮郤主小腹熱大便

堅

白環俞

見腰脊

扶承

見痔

大腸俞治大小便不利

銅見腹脹

會陰治不得大小便

見陰痛

浮郤治小腸熱

大腸結

見筋急

膀胱俞療大小便難尿赤

明

交信療

大小便難

一卒傷寒大小便不通予與五苓散而皆通五苓固

利小便矣而大便亦通者津液生故也或小便通而

大便尚不通宜用蜜九道之

必用方婦人老人大便祕用麻子蘇子煮粥食

最佳

小便不禁

遺尿附

承漿主小便不禁

見便黃

關元

又主婦人小便數泄不止

涌泉主

小便數

少府主陰暴痛遺尿

千

關門

中府

甲作委中

神門主遺尿

陰陵泉

陽陵泉主失禁遺尿不自

知太衝主女遺尿

見症

關門治遺溺善滿

銅

箕門

見淋

通里

見傷寒千同

大敦

見症

膀胱俞

見便赤

太衝

見小

便不利

委中

見腰脊

神門治遺溺

見心煩

陰包治遺溺

不禁

見腰痛

遺溺灸陽陵泉或足陽明各隨年

千

遺

溺失禁出不自知灸陰陵泉隨年

小便失禁灸大敦

或行間七壯

尿床灸臍下橫文七壯婦人遺尿灸橫

骨七壯 小兒遺尿灸臍下寸半隨年又灸大敦三壯

餘見千金

曲泉陰谷陰陵泉復溜

此諸穴斷小便利大佳不損陽氣亦云止遺尿

大便不禁

餘見泄瀉

大腸俞次窳主大小便利 陽綱主大便不節

明同腸鳴

泄注小便赤黃 承扶主尻中腫大便直出陰胞有寒

小便不利 屈骨端主大便泄數小便不利并灸天樞

丹田主泄利不禁小便絞痛 關元療洩痢虛脹小

便難

明

冤門治大便不節

銅

老小大便失禁灸兩足

大指去甲一寸三壯又灸大指歧間各三壯千三里主霍亂遺失

大便不禁病亦悞矣神闕石門丹田屈骨端等皆是穴處宜速灸之予頃患脾泄醫謂有積以冷藥利之大便不禁服鎮靈丹十餘丸午夜各數丸而愈今人服此丹三五丸不效則不服是以一勺水救輿薪火也可乎哉

泄瀉 餘見吐瀉

曲泉治泄利四支不舉

銅見症

腹結治腹寒泄利

見臍痛

神闕治泄利不止小兒妳利不絕腹大繞臍痛氣穴

治婦人泄利不止

見月事

陽綱治大便泄利意舍治

大便秘泄

並見腹脹

梁門治大腸滑泄穀不化

見積氣

關

門治泄利不欲食

見積氣

天樞治泄利食不化三焦

俞治水穀不化欲泄注

見腹脹

懸樞治水穀不化下利

見積聚

脊中治溫病積聚下利中膠治腹脹下利食

泄脾俞治泄利

見腹脹

膀胱俞治泄利腹痛大腸

俞 腎俞治洞洩食不化

見勞瘵

會陽治腹中冷氣洩

利不止

京門治小腹急腫腸鳴洞洩膠樞引痛 三

間治腹滿腸鳴洞洩

然谷治兒洞洩

見口噤

關元療

腹洩不止

明下見賁豚

京門然谷陰陵泉主洞泄不化 千

腎俞

章門主寒中洞泄不化

京門

崑崙主洞

泄體痛

長強主頭重洞泄明下云洞洩不禁

陰陵

泉

隱白主胃中熱暴泄

大腸俞主腸鳴腹脹腫暴

洩

三焦俞

小腸俞

下竅

意舍

章門主腸鳴

腹脹欲泄注會陽主腹中有寒泄注腸澼便血束骨

主腸澼泄天樞主冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃

間遊氣切痛若心腹痛而後泄此寒氣客於腸間云云

灸關元百壯服當歸縮砂湯指泄瀉宜先灸臍中次

灸關元等穴

飧泄

中竅主腹脹飧泄下廉治小腹痛飧洩次指間痛脣

乾涎出不覺不得汗出毛髮焦脫肉少氣胃中熱不嗜

食

上廉

見脇痛

治飧洩

陰陵泉主婦人飧泄

見疝瘕

素問言春傷於風夏必飧泄苟知傷於風而得之則

藥自可治雖不著艾未為害也

本事方云飧泄者食穀不化也春時木旺肝生風邪淫於脾經至夏引冷當風故多飧泄宜芎藭丸芎藭神麴白朮附子等分細末糊圓梧子大每服三五十丸米飲下治脾濕而泄者萬無不中其用芎除濕有理故載于此

溲泄

三陰交治溲洩食不化

銅見腹脹

地機

見水腫

治溲洩

地

機主溲瘕腹痛藏癰

千

太衝等主溲泄

見痢

予嘗患痺疼既愈而溲利者久之因灸臍中遂不登
溲連三日灸之三夕不登溲若灸溲泄臍中第一三
陰交等穴乃其次也

本事方云一親每五更初必溲痢一次者數月有人云
此名腎泄腎感陰氣而然服五味子散愈

五味子二兩
吳茱萸半兩

細粒綠色者並炒香熟為末每服二錢陳米飲下

其論瀉利有理故附載之

予舊患瀉利每天曉必如廁人教贖豆附丸服即愈其方不可得也他年再患此只用薑煎附子加豆蔻服愈

痢 餘見瀉

素問言泄痢有五種一曰胃泄飲食不化而色黃胃與脾合故黃也二曰脾泄腹脹而注泄無休又上逆嘔此為寒熱之患也三曰大腸泄食畢腸鳴切痛而

痢白色大腸與肺合故白也四曰小腸泄身瘦而便
膿血小腸與心合心主血也五曰大瘕泄裏急後重
數至圜不能便莖中痛此腎泄也諸家方有二十餘
種此唯言五種蓋舉其綱也必用方亦有赤白痢蠱
之別其大槩則藏府寒也廩丘公所謂諸下悉寒是
也數予治人痢惟與以鎮靈丹無有不效或未效更
加丸數則效矣若蠱利則用栢葉黃連煎服見既諸
痢惟耆域方用厚朴櫻栗殼末最佳後人又加木香

黃連陳皮等分甘草拌之黃穀葉數片姜棗烏梅水煎予嘗用之驗故載于此然痢本無惡證而有患此而死者或者世醫以痢為熱病多服冷藥故也若其急難亦當灼艾不可專用藥云

復溜主腸辟便膿血泄痢後重腹痛如瘕狀

交信

主泄痢赤白

同銅

漏血

太衝

曲泉主澹泄痢注下血

小腸俞主泄痢膿血五色重下腫痛 丹田主泄痢

不禁小便絞痛 關元大谿主泄痢不止 脾俞主泄

痢不食食不生肌 五樞主婦人赤白裏急瘕瘕 曲

泉治泄水下利膿血

銅見風勞

中膺俞治腸冷赤白痢

明同

膀胱俞療泄痢腹痛

明

脊俞療溫病積聚下痢

銅作

下利

關元療洩痢

見便不禁

小兒痢下赤白秋末脫肛每

廁腹痛不可忍灸十二椎下節間名接脊穴一壯 黃

帝療小兒疳痢脫肛體瘦渴飲形容瘦悴諸藥不差灸

尾翠骨上三寸骨陷間三壯 岐伯云三伏內用桃水

浴孩子午正時當日灸之用青帛拭似見疳蟲隨汗出

神效 小兒伏深冷痢不止灸臍下二寸三寸間動脉

中三壯 婦人水洩痢灸氣海百壯 泄痢食不消不

作肌膚灸脾俞隨年壯 十 泄注五利便膿重下腹痛灸

小腸俞百壯 泄痢不禁小腹絞痛灸石門百壯 三

報

久痢百治不差灸足陽門下一寸高骨上陷中去大指

歧三寸隨年又臍中二三百壯又關元三百 十日 赤

灸

白下灸窮骨多為佳四支不舉多汗洞痢灸大橫隨年

餘見 千金 痢暴下如水云云氣海百壯 指

便血

餘見痢

腸風

復溜

太衝等

並見痢

會陽

見瀉

主便血

千

下廉

幽

門明

太白

見吐瀉

治洩利膿血

銅

太白治吐洩膿血

見腹脹

小腸俞治大便膿血出

明同

下膠治大便下血

腹哀治大便膿血

見腹痛

千又云寒中食不化腹痛

勞宮

見傷寒

治大小便血

陸氏續集驗方治下血不止量臍心與脊骨平於脊

骨上灸七壯即止如再發即再灸七壯永除根本目

觀數人有效予嘗用此灸人腸風皆除根本神效無比然亦須按其骨突處痠疼方灸之不疼則不灸也但便血本因於腸風腸風即腸痔不可分而為三或分為三而治之非也

痔瘻
瘻 漏 餘見瘍瘻

長強治腸風下血五種痔瘡蝕下部蠱此痔根本是冷

謹冷食房勞

銅與明同

明下云療久痔 會陰治穀道瘙擾

久痔相通者死

千云主痔與陰相通者死

會陽治久痔 小腸俞

治五痔疼

明同

秩邊治五痔發腫

復溜治血痔洩後

腫

飛揚治野雞痔

承山治久痔腫痛

扶承治久

痔尻腫大便難陰脬有寒小便不利千云療五種痔

瀉鮮血尻腫中腫大便難小便不利

氣海俞療痔病

瀉血

明

飛揚主痔篡傷痛

商丘

復溜主痔血泄

後重 勞宮主熱痔

承筋

承扶

委中

陽谷主

痔痛按腫

商丘主痔骨蝕

銅云痔疾骨疽蝕

支溝

章

門主馬刀腫癭

絕骨主癭馬刀按腫

俠谿

陽輔

銅同

太衝主拔下腫馬刀瘻

銅云太衝臨泣治馬刀瘻瘻

天突

章門

天池

支溝王漏

天突

天臑主漏頸痛

長強療下漏

明見痔一千用亭厯子豉作餅灸漏外臺云不可灸頭瘡亭厯氣入腦殺人

灸痔法疾若未深尾閭骨下近穀道灸一穴便可除去

如傳信方先以經年槐枝煎湯洗後灸其上七壯大稱

其驗如本草只以馬藍菜根一握水三碗煎碗半乘熱

以小口瓦器中熏洗令腫退於元生鼠妳根上灸

即不可灸

尖頭恐效遲

如患深用湯洗未退易湯洗令消然後灸覺火

氣通至胃乃效病雖深至二十餘壯永絕根本以竹片
護四邊肉仍於天色寒涼時灸忌毒物

集效

千金灸漏更有數穴

腸風

脊端窮骨

脊骨盡處

名龜尾當中灸三壯治腸風瀉血即

愈須顛倒身方灸得

久冷五痔便血脊中百壯

千翼

何教授湯簿有此疾積年皆一灸除根湯簿因傳此

法後觀灸經此穴療小兒脫肛瀉血蓋岐伯灸小兒

法也後人因之以灸大人腸風瀉血爾蓋大人小兒之病初不異故也五痔便血失屎

迴氣百壯在脊窮骨上赤白下

長強治腸風下血

銅見痔

腸風藥甚衆多不作效何也本草衍義曰腸風乃腸痔苟知其為痔而治之無不效矣若灸腸風長強為要穴云近李倉腸風市醫以杖量臍中於脊骨當臍處灸即愈予因此為人灸腸風皆除根

陸氏方治下血除根

腸癖

復留

見痛

束骨

會陽

見瀉

主腸辟

千

中都治腸辟瘕

疝小腹痛

銅

四滿治腸辟切痛

見積聚

結積留飲辟

囊胃滿飲食不消灸通谷五十壯

千

大腸俞主風腹

中雷鳴大腸灌沸腸辟洩痢食不消化小腹絞痛腰脊

疼強大小便難不能飲食灸百壯三報之諸結積留飲

癖囊胃滿飲食不消通谷五十壯又胃管三百三報之

第十五椎名下極俞主腹中疾腰痛膀胱寒癖飲注下

隨年壯

千翼

會陽主腹中有寒泄注腸辟便血 束骨

主腸辟泄 膺臆主腸鳴泄注 陽綱主大便不節小

便赤黃腸鳴泄注 三焦俞小腸俞下竅意舍章門主

腸鳴腹脹欲泄注 千

腸痛 餘見腸辟

太白主腸痛

甲見
腸鳴

陷谷等主腸痛

千見
腸鳴

商曲治腸

切痛

銅見
積聚

建里療腸中疼嘔逆上氣心痛身腫

明

氣衝治腸中之熱

銅見
上氣

腸痛亦多端若疼甚者乃腸癰急宜服內補十全散

等藥其他宜隨證灸之有老嫗大腸中常若裏急後重甚苦之自言人必無老新婦此奇疾也為按其大腸俞疼甚令歸灸之而愈

腸癰為病小腸重小便數似淋或繞臍生瘡或膿從臍出大便秘出膿血屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血止差

胡權內補十全散治腸癰神效

腸鳴 腹鳴

不容治腹虛鳴

銅見症癖

三間主胃滿腸鳴

千

胃俞主

腹滿而鳴

明下云腹中鳴

臍中主腸中常鳴上衝於心

天

樞主腹脹腸鳴氣上衝胃

又主婦人

陰都主心滿氣逆腸

鳴 太白 公孫

大腸俞

三焦俞等

見瀉

主腸鳴

陰交主腸鳴濯濯如有水聲

上廉主腸鳴相追逐

漏谷主腸鳴強欠心悲氣逆

膺腧主腸鳴泄注

陷

谷 溫溜 漏谷

復溜

陽綱主腸鳴而痛下竅主

婦人腸鳴注泄

胃脇脹腸鳴切痛太白主之

甲

三

里見

三間

京門

見瀉

關門

見積氣

三陰交

見腹脹

陷谷一水分

神闕

並見水腫

承滿溫溜三焦俞大腸俞

胃俞

腹脹

天樞

月事

治腸鳴

銅

章門治腸鳴盈盈然

同千

食不化脅痛不得卧煩熱口乾不嗜食胃脇支滿喘息

心痛腰

下經有背脅

痛不得轉側

上廉治腸鳴氣走疰痛

商丘治腹脹腸鳴不便脾虛令人不樂身寒善太息

心悲氣逆

復溜治腹雷鳴

見鼓張

腎俞療腹痛雷鳴

腹痛

明見

承滿療腸鳴腹脹上喘氣逆

下

陽綱療食飲

不下腹中雷鳴腹滿脹大便洩消渴身熱面目黃不

嗜食怠惰

下

千云主腸鳴

見大便不禁

三焦俞療腹脹腸

鳴腸中雷鳴相逐痢下灸承滿五十壯

千

天樞主腹

脹腸鳴氣上衝胃不能久立腹痛濯濯冬日重感於寒則

泄瀉

見泄瀉

食不化嗜食身腫夾臍急

腹中雷鳴灸太衝

無限壯數

千見上氣

脫肛

百會療脫肛

明

下云療大人小兒脫肛銅云治小兒脫

肛久不差 岐伯療小兒脫肛瀉血秋深不較灸龜尾

一壯脊端窮骨也 黃帝灸小兒瘡痢脫肛 小兒痢

下脫肛

並見痢

小兒脫肛灸頂上旋毛中三壯即入

千

或尾翠骨三壯或臍中隨年 寒冷脫肛灸翠骨七壯

立愈神效臍中隨年

千翼

橫骨百壯或龜尾七壯

窮骨

人有小女患痢脫肛予傳得一方用草茶葉一握薑

七片令煎服而愈然不知其方所自來也後閱坡文

始知生薑咬咀煎茶乃東坡治文潞公痢之方也故

附於此

霍亂轉筋

筋緩急

餘見手足攣

凡霍亂頭痛胃滿呼吸喘鳴窮窘不得息人迎主之

千

巨闕

明云療霍亂不識人

關衝

支溝

公孫

陰陵泉主

霍亂

太陰

大都

金門

僕參主厥逆霍亂

太

白主霍亂逆氣

魚際主胃逆霍亂

承筋主霍亂脛

不仁承筋

僕參

見尸厥

解谿

陰陵泉

見

治霍亂

金門

僕參

承山

承筋轉筋霍亂

千

承山治

霍亂轉筋大便難

銅

金門治霍亂轉筋

曲泉

見症

懸鍾

見膝

陽輔

見膝

京骨

見足

胃俞治筋攣

見腹

脹

僕參

見足

竅陰

見無

至陰

見頭

解谿

見風

丘墟

見掖

治轉筋

髀關治筋絡急

銅見膝痛

浮郄治小

腸熱大腸結股外脛筋急髀樞不仁

曲池治筋緩捉

物不得挽弓不開屈伸難風臂肘細無力

中瀆治寒

氣客於分肉間痛攻上下筋痺不仁

承筋治寒搏轉

筋支腫大便難脚腠痠重引小腹痛

委中

見脚

附

陽承山

見腰脚

療筋急

明下

張仲文灸脚筋急

見腰脚

歧伯療脚轉筋發不可忍者灸脚踝上一壯內筋急灸

內外筋急灸外

解谿主膝重脚轉筋濕痺

千

竅陰

主四支轉筋

大淵主眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中相

引痛丘墟主脚急腫痛戰掉不能久立附筋足攣

委中委陽主筋急身熱

肝俞主筋寒熱痙筋急手相

引心俞肝俞主筋急手相引轉筋入腹痛欲死者

使四人捉手足灸臍左邊二寸十四壯

急備

千云臍上

一寸十四壯轉筋灸涌泉六七壯千轉筋四厥灸乳根

黑白際一壯 若手足厥冷三陰交二七壯 霍亂已

死有暖氣者承筋七壯起死人 又鹽內臍中灸二七

壯 腰背不便轉筋急痺筋攣二十一椎隨年轉筋在

兩臂及胷中灸手掌白肉際七壯 又灸亶中中府巨

闕胃管尺澤并治筋拘頭足皆愈 腹脹轉筋臍上一

寸二七壯 人有身屈不可行亦有膝上腫疼動不得

子為灸陽陵泉皆愈已救百餘人矣神效無比有吐瀉轉筋者

予教灸水分即止

轉筋十指攣急不得屈伸灸脚外踝骨上

七壯

餘見千金

霍亂吐瀉

餘見轉筋

凡霍亂泄出不知先取太谿後取太倉之原千三

里主霍亂遺矢失氣 期門主霍亂泄注 尺澤主嘔

泄上下出脇下痛 太白主腹脹食不化喜嘔泄有膿

血 關衝治霍亂胃中氣噎不嗜食臂肘痛不舉銅

人迎治吐逆霍亂胃滿喘呼不得息 期門治胃中煩

熱賁脉上下目青而嘔霍亂洩利腹堅硬大喘不得卧

脇下積氣 上腕治霍亂吐利身熱汗不出 隱白治

吐洩

見腹脹

中腕治霍亂出洩不自知 支溝 天樞

治嘔吐霍亂

見臍痛

太白治氣逆霍亂腹痛又吐洩膿

血

見腹脹

陰郤治心痛霍亂胃滿 上管治霍亂心痛

不可卧吐利

明

巨闕治胃脇滿霍亂吐利不止困頓

不知人

下

吐逆霍亂吐血灸手心主五十壯 凡霍亂

先心痛及先吐灸巨闕七壯若先腹痛太倉二七壯若

先下利灸大腸募

臍旁二寸

男左女右若吐下不禁兩手脉

疾數灸蔽骨下三寸又臍下三寸各七十壯若下不止

太都七壯若泄利傷煩欲死慈宮二七壯

霍亂吐瀉尤當速治宜服來復丹鎮靈丹等藥以多

為貴尤宜灸上管中腕神闕關元等穴若水分穴尤

不可緩蓋水穀不分而後泄瀉此穴一名分水能分

水穀故也或兼灸中管穴須先中管而後水分可也

嘔吐

又見喘嗽

胃俞主嘔吐筋攣食不下千 商丘主脾虛令人病寒

不樂好太息多寒熱喜嘔 商丘 幽門 通谷主喜

嘔 陽陵泉主嘔宿汗心下澹澹 天容主欬逆嘔沫

曲澤主逆氣嘔涎 維道主嘔逆不止 大鍾 太

谿主煩心滿嘔 絕骨主病熱欲嘔 俞府明下云不下食

靈墟 巨闕 率谷 神藏主嘔吐胃滿 胃俞 腎

俞 石門 中庭等見反 少商 勞宮主嘔吐 隱

白主鬲中嘔吐不欲食 魂門 陽關主嘔吐不住多

涎 巨闕 胃堂主吐食 鬲俞主吐食又灸章門

胃管 魚際療膈虛食欲嘔身熱汗出唾嘔吐血唾血

明

中庭

見反胃

療嘔吐

明

云門

見上氣

療嘔逆

神藏

靈墟治嘔吐胃滿

銅見胃脇滿

承光

見頭痛

大都

見腹滿

治

嘔吐

太衝治嘔逆發寒

見症

大鍾治嘔逆多寒

見淋

勞宮

見傷寒

治氣逆嘔噦

維道治嘔逆不止三焦不調

水腫不嗜食

上膠治嘔逆

鬲關治嘔噦多涎唾

見背

痛

率谷治嘔吐不止

見痰

肺俞治上氣嘔吐

見上氣

玉堂治嘔吐寒痰上氣 心俞治嘔吐不下食

見狂走

中庭

見胃滿

膻府

見喘

意舍

見腹脹

治嘔吐 鬲俞治欬

逆嘔逆鬲胃

明作上

寒痰食飲不下胃滿支腫脇痛腹脹

胃脘暴痛

膽俞治嘔則食無所出

見腹脹

魄戶治嘔

吐煩滿

見上氣

亶中治吐涎

太谿治嘔吐口中如膠

善噫

顙顙治小兒嘔吐涎沫

痰脉治小兒嘔吐洩

利

並見小兒痰癎

築賓

見狂

少海治嘔吐涎沫

廉泉療喘

息嘔沫

明見少氣

築賓療嘔吐不止

幽門療善吐食飲

不下兼唾多吐涎乾噦嘔沫

下

上管療嘔吐食不下

腹脹氣滿心忪驚悸時吐嘔血腹疔痛痰多吐涎

小

兒吐乳灸中庭一壯 粥食湯藥皆吐不停灸間使

見千

嘔乾 吐逆嘔不得食灸心俞百壯或胃堂百壯或巨闕

五十 嘔吐宿汁吞酸灸日月百壯三報或鹽半斤炒

故帛裹就熱熨痛處主嘔吐若心腹痛而嘔此寒熱客

於腸胃云云灸中腕

指

三焦俞主飲食吐逆

千見
腹脹

隱白療嘔吐

明

太白治嘔吐

三焦俞治吐逆

並見
腹脹

乾嘔

極泉

俠白治心痛乾嘔煩滿

銅

通谷療乾嘔無所

出又治勞食飲隔結

明

膽俞療胃脇支滿嘔無所出

口舌乾飲食不下

幽門療乾噦

下見吐

乾嘔不止粥

食湯藥皆吐不停灸手間使三十壯若四厥脉沈絕不

至灸便通此起死法

千

乾嘔灸心主尺澤亦佳又灸

乳下一寸三十壯

霍亂乾嘔間使七壯不差更灸

千金言生薑乃嘔家聖藥有此疾者蚤上宜多用生

薑泡湯服或煨或生嚼或取自然汁入酒服皆效

隱白主腹滿喜嘔千乾嘔灸心主尺澤佳又乳下一寸

三十壯凡噦令人惋恨

承漿七壯如麥大又臍下四指七壯卒噦臍中中府胃管各數

十壯尺澤巨闕七壯

噫

蟲溝主數噫恐悸氣不足千

陷谷主腹大滿喜噫

鳩尾主噫喘胃滿欬嘔少海主氣逆呼吸噫噦嘔

勞宮主氣逆噫不止欬唾噫善欬氣無所出先取三

里後取太白章門 大敦主噦噫又灸石關 太谿

見吐

治善噫

銅

蠡溝治數噫

見症

神門治數噫恐悸

見心煩

陷谷

見水腫

期門治產後善噫

見心痛

太淵治噫氣

上逆 少商治煩心善噦心下滿汗出而寒欬逆 太

淵治善噦嘔

見胃痺

溫溜治傷寒噦逆噫噦鬲中氣閉

寒灸腋下聚毛下附肋宛宛中五十壯

千

噫噦嘔逆灸

石關百壯

傷寒嘔噦

諸噦

巨闕主傷寒煩心喜嘔千 甲云主心腹脹噫煩熱善嘔

鬲中不利 間使主熱病煩心喜噦胃中澹澹 溫溜

主傷寒寒熱頭痛噦衄 百會主汗出而嘔瘧 商丘

主寒熱好嘔 大椎主傷寒熱盛煩嘔 腎俞主頭身

熱赤欲嘔並千 勞宮主熱病煩滿欲嘔噦甲 曲澤主

傷寒逆氣嘔唾千

必用方論噦者俗云克逆也鍼灸者當以此求之

若氣自腹中起上築咽喉逆氣連屬不能出或至數十

聲上下不得喘息此由寒傷胃腕腎氣先虛逆氣上乘
於胃與氣相併不止者難治謂之噦宜茱萸丸灸中腕
關元百壯未止灸腎俞百壯

指

唾

中府治欬唾濁涕

銅見肺氣

庫房治多唾濁沫膿血 周

榮治欬唾稠膿

並見胃脅滿

少商治腹滿唾沫

見瘡

百會

見癰治唾沫

石關治多唾嘔沫

明下

庫房治肺寒欬嗽

唾膿

見逆氣

幽門

見同

治嘔沫吐涎喜唾

銅

石關治脊

強不開多唾

日月治多唾

見悲愁

天井治心胃痛欬

嗽上氣吐膿不嗜食

紫宮治吐血及唾如白膠

明

曲澤主傷寒逆氣嘔唾千

名醫賈祐錄云積主藏病聚主府病積者是飲食包結不消聚者是伏痰結而不化痰伏在上鬲主頭目眩痛多自涎唾或致潮熱用平胃散烏金散治之其論有理故載之

胃痛

寒熱

魚際療胃氣逆

明

分水治胃脹不調

見腹

銅云胃虛

脹不嗜食

鬲俞治胃脘暴痛

銅見嘔吐

下管治腹胃不

調腹痛

明見腹堅

腎俞主胃寒脹

千見食多

胃俞治胃中寒

銅見腹脹

水分治胃虛脹

見水腫

三里治胃中寒心腹脹

滿胃氣不足惡聞食臭腸鳴腹脹痛食不化

明下同

下廉

見驗

懸鍾治胃熱不嗜食

心俞療胃中弱食不下

明

太淵

千見心痛

療胃氣上逆唾血

治胃補胃胃俞百

壯胃寒不能食食多身瘦腸鳴腹滿胃脹胃熱三里三

十壯反胃食即吐上氣灸兩乳下各一寸

以差為期

又臍上

一寸二十壯又內踝下三指稍斜向前穴三壯

外臺云一指

千翼

反胃

凡食飲不化入腹還出先取下管後取三里瀉之章

門主食飲不化入腹還出

見不嗜食

中庭中府主鬲寒

食不下嘔吐還出又主嘔逆吐食不得出中庭療胃

脇支滿心下滿

銅明同下

食不下嘔逆吐食還出

三里療

胃氣不足反胃

胃俞

見不能食

療吐食

意舍療吐食不

留住

下見背痛

吐逆食不住胃管百壯

十

吐嘔逆不得下

食今日食明日吐灸鬲俞百壯

有人久患反胃予與鎮靈丹服更令服七氣湯遂能
立食若加以著艾尤為佳也有老婦人患反胃飲食
至晚即吐出見其氣繞臍而轉予為點水分氣海并
夾臍邊兩穴他歸只灸水分氣海即愈神效

食不下

不化

魂門治飲食不下腹中雷鳴

銅

三焦俞治吐逆飲食

不下

見腹脹

胃倉

意舍

見腹脹

鬲關治食飲不下

見背

痛

胃俞主嘔吐筋攣食不下

千

大腸俞

周榮主

食不下喜飲

中庭

中府主鬲寒食不下

見反胃

陽

綱期門

少商

勞宮主飲食不下

三焦俞主傷

寒頭痛食不下

心俞治胃弱食飲不下

明下

鬲俞治

鬲寒食飲不下腹脇滿胃弱食少嗜卧怠惰不欲動身

溫不能食千云主吐食

見嘔

陽綱治食不下腹中雷鳴

大小便下節黃水

明

紫宮

見煩心

中庭

見反胃

膽俞

見嘔治飲食不下

三里

見胃

大腸俞

三陰交

並見腹脹

下腕

見腹痛

三焦俞

懸樞

見瀉

梁門

見積氣

治穀不化

天樞

見瀉

志室

見脊痛

腎俞

見勞

治食不化

腹哀治

寒中食不化

三焦俞治水穀不消腹脹腰痛吐逆

明

腹哀

銅同

太白

見瀉

主食不化

十

凡食飲不化入腹

還出先取下管後取三里瀉之

石門主不欲食穀入

不化

天樞

厲兌

內庭主食不化不嗜食夾臍痛

章門主食飲不化

見不嗜食

上管

中管主寒中傷飽

食飲不化

中庭治胃脇滿食不下

見反胃

胃管

三

焦俞主小腹積聚堅大如盤胃脹食不消

千

志室

明見

腹痛療食不下

太白

公孫

見腹脹

主食不化

中府

胃倉承滿

見腹脹

魚際

見腹脹

周榮

見胸滿

治食不下

中管

腹脹

三陰交

見腹脹

治食不化

不能食

然谷治腦痛不能食

銅見痰

豐隆主不能食

中極主

飢不能食 胃俞主嘔吐筋攣食不下不能食 維道

主三焦有水氣不能食 鬲俞主傷寒嗜卧怠惰不欲

動身濕不能食銅同 石門主不欲食穀入不化 率谷

主醉酒風熱發不能飲食嘔吐甲 少商療不能食腹

中氣滿喫食無味明 分水見腹痛 療不能食 胃俞療

煩滿吐食腹脹不能食下云療胃中寒氣不能食胃脇

滿身瘦不能食胃滿鬲上逆氣悶熱灸大腸俞二七壯

小兒減之子 三里療腹滿不能食胃氣不足反胃明

不能飲食見腸辟藏府積聚及飲食不消見寒熱涌泉
主心痛不嗜食咽中痛不可內食見虛勞脾俞胃俞治
不嗜食

不嗜食

凡不嗜食刺然谷多見血使人立飢千 隱白見吐 然

谷 脾俞 內庭主不嗜食 天樞 厲兌 內庭主

食不化不嗜食夾臍急 中封主身黃有微熱不嗜食

章門主食飲不化入腹還出熱中不嗜食苦吞而聞

食臭傷飽身黃酸疼羸瘦 肺俞治上氣嘔吐支滿不

嗜食

銅

胃俞脾俞治腹痛不嗜食

見腹脹

地機

陰

陵泉

水分

並見水腫

幽門

見胃痛

小腸俞

見脚氣

治不嗜

食

下腕治六府氣寒不嗜食

見腹痛

下廉

見飧洩

懸

鍾治胃熱不嗜食

見膝摩

陰蹻療病飢不欲食

明

懸

鍾療腹滿中焦客熱不嗜食

明下

又云心腹脹滿胃熱不

嗜食

陽綱

見腸鳴

療不嗜食

分水治胃虛脹不嗜食

銅

不嗜食有數端有三焦客熱不嗜食有胃熱不嗜食

有胃寒不嗜食有六府氣寒不嗜食固當隨證用藥
治之而針灸者亦當知補瀉之法可也

史記陽虛侯病甚衆醫皆以為虛太倉公診脉以為
痺根在右脇下大如覆杯令人喘逆氣不能食病得
之內即以火齊粥且飲六日氣下即令更服圓藥出
入六日病已然則人之不能食亦有患痺而得者槩
曰胃有寒熱則不可也

扁鵲曰凡人心風灸心俞肝俞主心風腹脹滿食不消

化四支羸露不欲食

見中風

曲泉主不嗜食見無子

食氣無味

三里治食氣惡聞食臭

見胃

大杼治食氣

百會

見風

癰

少商

見不能食

療喫食無味

明

凡身重不得食食無

味心下虛滿時時欲下喜卧皆針胃管太倉服建中湯

及平胃丸

有鑽胃丸溫中開胃病人觀飲食不得三五服即思

食破故紙半兩肉苁蓉四枚為末蒸棗肉丸梧子大

空心米飲三十丸

食多

脾俞治食飲多身瘦

銅見腹脹

腎俞療食多身瘦

明下見勞

胃俞 腎俞主胃中寒脹食多身瘦 脾俞大腸俞主

食多身瘦

見腹脹

舍姪偶食罷即飢再食又飢自碎生薑濃泡二碗服

愈

瘧 脾寒

千金云夫瘡皆生於風夏傷於暑秋為瘡

瘡同瘡素問云瘡

猶老也亦瘦也楊上善云二日一發為瘡瘡其說與素問千金異

瘡有數名先寒後

熱曰寒瘡先熱後寒曰溫瘡熱而不寒曰痺瘡多寒

曰牡瘡久不差曰勞瘡

久不斷曰老瘡

時行後變成瘡曰瘡

瘡病結為癰疽曰瘡母以至肝肺脾腎心胃亦皆有

瘡或每日發或間日發或作稍益晏或作日益早素

問千金等方論之詳矣治瘡之方甚多惟小金丹為

最佳予嘗以予人皆效然人豈得皆有此藥哉此灸

之所以不可廢也鄉居人用旱蓮草推碎實在手掌
上一夫四指間也當兩筋中以古文鐃壓之繫之以故帛
未久即起小泡謂之天灸尚能愈瘡況於灸乎故詳
著之

譴喜治溫瘡寒瘡

明

下云療瘡久不愈

腰俞

中管

治溫瘡痲瘡

鬲俞

見瘡

命門

見頭疼

太溪

見欬逆

療瘡

瘡

陰踠治暴瘡

上廉治寒瘡

三間治瘡寒熱瘡

口乾身熱喘目急痛

至陰治瘡發寒熱頭重煩心

下

液門 合谷 陷谷 天池治寒熱瘡瘡 偏厯治

發寒熱瘡久不愈目視眊眊 大椎治瘡瘡久不愈

少府治瘡瘡久不愈者煩滿少氣悲恐畏人臂酸掌熱

手握不伸 陶道治瘡瘡寒熱洒淅 命門治寒熱瘡

瘡腰腹相引痛 足臨泣治瘡日西發千同銅云 療

小兒瘡久不愈灸足大指次指外間陷中各一壯並下

太谿見心 照海 中渚治久瘡 丘墟治久瘡振寒

千 陷谷治瘡 中封治瘡瘡色蒼蒼千云 振寒小腹

腫食快快 繞臍痛足逆冷不嗜食身體不仁 液門

治痲瘧寒熱目眩頭痛暴得耳聾 腕骨治痲瘧頭痛

煩悶 商陽治寒熱痲瘧口乾明下云治瘧口乾 諶

譚

見肩背痛

中腕

白環俞治溫瘧

見腰脊

上膠

偏歷

治寒熱瘧 三間治寒瘧脣焦口乾氣喘 脾俞治痲

瘧寒熱

有人患久瘧諸藥不效或教之以灸脾俞即愈更一

人亦久患瘧聞之亦灸此穴而愈蓋瘧多因飲食得

之故灸脾俞作效

內庭 厲兌

面腫

公孫治寒瘧不嗜食 京骨治瘧寒

熱喜驚不欲食

明下同

神門治瘧心煩甚欲得飲冷惡

寒則欲處溫中咽乾不嗜食 合谷 陽谿 後谿

陽池 陰都治身寒熱瘧

明下云瘧瘧

病心下煩滿氣逆

天樞治寒瘧 列缺治寒瘧嘔沫善笑縱脣口

明下云瘧瘧面

色不定

少商治瘧瘧振寒腹滿

明下有煩心善嘔

唾沫脣乾引

飲不下膨膨手攣指痛寒慄鼓頷喉鳴 經渠治瘧寒

熱胃背拘急胃滿膨膨

明同

大椎腰俞治溫瘧瘧

明同

大杼療瘧頸項強不可俛仰頭痛振寒 前谷 風

池

神道

見頭痛

百會治瘧瘧上星治瘧瘧振寒熱汗

不出 偏厯主風瘧汗不出

千

少澤

明云頭痛銅云寒熱

復

溜 崑崙主瘧寒汗不出 銜陽主瘧先寒洗淅甚久

而熱熱去汗出 然谷 崑崙主瘧多汗 甲云主瘧

多汗腰痛不可俛仰目如脫項如拔 列缺 後谿

少澤 前谷主瘧寒熱 太泉 太谿 經渠主瘧欬

逆心悶不得卧寒熱 大陵 腕骨 陽谷 少衝主

乍寒乍熱瘧 天樞主瘧振寒熱盛狂言 太鍾主瘧

多寒少熱 甲云瘧悶嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒

厥足熱 商丘主寒瘧腹痛 少海主瘧背振寒 甲

云項痛引肘掖腰痛少腹四支不舉 陽谿主瘧甚苦

寒欬嘔沫 厲兌 內庭主瘧不嗜食惡寒 少商主

瘧振慄鼓頷 商丘 神庭 上星 百會 完骨

風池 神道 掖門 前谷 光明 至陰 大杼主

痰癰熱 陰都 少海 商陽 三間 中渚主癰身

熱 列缺主癰甚熱 陽谷主癰脇痛不得息 俠谿

主癰足痛 衝陽 束骨主癰從脚脢起 陽谷主癰

脇痛不得息 飛揚主狂癰頭眩痛瘕反折 溫留主

癰面赤腫 天井主癰食時發心痛悲傷不樂 天府

主癰病 譙譙 支正 小海主風癰 三里 陷谷

俠谿 飛揚主痰癰少氣

大附子一枚炮末薑兩半取自然汁丸如小豆大每

十五丸空心熱酒吞下老少加減川客治瘧只二三服皆愈云兼治脾胃愈於薑附湯故附此

脾疼

餘見心腹痛

府舍治疝癖脾中急痛循脅上下搶心腹滿積聚厥氣

兩乳

銅

商丘治脾虛令人不樂

見腸鳴
千見吐

三陰交治

脾病身重

見腹
脹

予嘗久患脾疼服治脾藥反膨脹不得已依耆域方用麴裹火炮蓬莪朮水與酒醋煎服立愈已而告

人人亦云高良薑末米飲調服亦作效後鄭教授傳
一方云草果延胡索苓脂并沒藥酒調三兩錢一似
手拈却草果子五苓脂四味等分為末此亦平穩藥
也有此疾者宜服之或不吐不瀉心中疼甚日輕夜
甚者用乾鹽梅并茶煎服神效 若灸者宜上管中管
下管脾俞三陰交等穴

鍼灸資生經卷三

欽定四庫全書

子部

鍼灸資生經卷二

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官中書臣孫球

謄錄監生臣于復慙

欽定四庫全書

鍼灸資生經卷二

鍼灸須藥

千金云病有須鍼者即鍼刺以補瀉之不宜鍼者直
爾灸之然灸之大法其孔穴與鍼無忌即下白鍼或
溫鍼訖乃灸之此為良醫其脚氣一病最宜鍼若鍼
而不灸灸而不鍼非良醫也鍼灸而藥藥不鍼灸亦
非良醫也但恨下里間知鍼者鮮爾所以學者須解

用鍼燔鍼白鍼皆須妙解知鍼知藥固是良醫此言
鍼灸與藥之相須也今人或但知鍼而不灸灸而不
鍼或惟用藥而不知鍼灸者皆犯孫真人所戒也而
世所謂醫者則但知有藥而已鍼灸則未嘗過而問
焉人或詰之則曰是外科也業貴精不貴雜也否則
曰富貴之家未必肯鍼灸也皆自文其過爾吾故詳
著千金之說以示人云

鍼忌

千金云夫用鍼者先明其孔穴補虛瀉實而失其理
鍼毛皮腠理勿傷肌肉鍼肌肉勿傷筋脉鍼筋脉勿
傷骨髓鍼骨髓勿傷諸絡傷筋膜者愕視失魂傷血
脉者煩亂失神傷皮毛者上氣失魄傷骨髓者呻吟
失志傷肌肉者四支不收失智此為五亂因鍼所生
若更失度有死之憂也 素問亦云刺骨無傷筋刺
筋無傷肉刺肉無傷脉刺脉無傷皮刺皮無傷肉刺
肉無傷筋刺筋無傷骨刺中心一日死中肝五日死

中腎六日死中肺三日死中脾十日死中膽一日半

死刺跗上中大脉血出不止死刺頭中腦戶入腦立

死

又無刺大醉大怒大勞大飢大渴大驚新飽云云詳見素問

孔穴相去

甲乙經云自大椎下至尾骶骨二十一椎長三尺折
量取俞穴或云第一椎上更有大椎在宛宛陷中非
有骨也有骨處即是第一椎若以大椎至尾骶二十
一椎長三尺法校之則上節云椎每傾一寸四分惟

第七椎下至於脊骨多分之七故上七節共九寸八分分之七下節十四椎每椎一寸四分分之五有奇故下七節共二尺一分分之三此亦是一說也但第一椎有骨乃骨節之收大椎雖無骨實是穴名既曰自大椎下至十一椎豈可不量大椎以下或者之說於是不通矣

自蔽骨下至臍八寸而中管居其中

上下各四十

氣穴論

注云中管居心蔽骨與臍之中是也按明堂下經云

鳩尾在臆前蔽骨下五分人無蔽骨者從歧骨際下行一寸則是欲定中管之中又當詳有蔽骨無蔽骨

也

當準人長短肥瘠量

自臍下寸半為氣海三寸為丹田至屈

骨凡五寸千金云屈骨在臍下五寸明堂下經亦云屈骨在橫骨上中極下一寸當準人長短肥瘠量之

銅人云幽門夾巨闕旁各五分肎俞夾臍各五分

明堂

云在巨闕旁各寸半通谷夾上管旁相去三寸

不容在幽門旁各寸半天樞

去肎俞寸半夾臍期門在不容旁寸半大橫直臍旁

不容天樞期門既各寸半
則幽門育俞各五分誤矣銅人云腎俞在十四椎下

兩旁各寸半與臍平育門在十三椎下相去各三寸
與鳩尾相直腎俞既與臍平育門乃與鳩尾相直亦
可疑也

甲乙經云人有長七尺五寸者髮以下至頤一尺結
喉至髑髀_{鳩尾也}一尺三寸髑髀至天樞八寸天樞至

橫骨六寸半橫骨至內輔上廉一尺八寸內輔上廉
至下廉三寸半內輔下廉至內踝一尺三寸內踝至

地三寸又膝臑至跗屬一尺六寸跗屬至地三寸又
肩至肘一尺七寸肘至腕一尺二寸半腕至中指本
節四寸本節至末四寸半

定髮際

明堂上經云如後髮際亦有項脚長者其毛直至骨
頭亦有無項脚者毛齊至天牖穴即無毛根如何取
穴答曰其毛不可輒定大約如此若的的定中府正
相當即是側相去各二寸此為定穴

下云兩眉中直上三寸為髮際

後大椎直上
三寸為髮際

論同身寸

下經曰岐伯以八分為一寸緣人有長短肥瘠不同

取穴不準扁鵲以手中指第一節為一寸緣人有身

長手短身短手長取穴亦不準孫真人取大拇指節

橫文為一寸亦有差互今取男左女右手中指第二

節內庭兩橫文相去為一寸

若屈指即旁取指則中
節上下兩文角角相去

遠近為一寸
謂同身寸
自依此寸法與人著灸療病多愈今以

為準銅人亦曰取中指內文為一寸素問云同身寸是也又多用繩度量繩多出縮不準今以薄竹片點量分寸療病準的亦有用蠟紙條量者但薄篋易折蠟紙亦粘手難取稻稈心量却易為勝於用繩之信縮也

審方書

經云爪甲與爪甲角內與外間內側與外側與夫陷中宛宛中要精審如某穴去某處幾寸與其穴去處

同者自各有經絡

灸膏肓云其間當有四肋三間灸中間者謂四肋必有三間當中間灸不灸邊兩間也

千金曰經云橫三間寸者則是三灸兩間一寸有三灸灸有三分三壯之處即為一寸也

又曰凡量一夫之法覆手并舒四指對度四指上下節橫過為一夫夫有兩種有三指為一夫者若灸脚

弱以四指為一夫也

見脚氣

穴名同異

手有三里五里足亦有三里五里手有上廉下廉足
亦有上廉下廉側頭部有竅陰足少陽亦有竅陰偃
伏部有臨泣足少陽亦有臨泣既有五里矣勞宮亦
名五里既有光明矣攢竹亦名光明肩有肩井又有
所謂中肩井足有崑崙又有所謂下崑崙太淵太泉
之名或殊天鼎天頂之字有異丹田初非石門和窅
明堂上經誤作和字亦非禾膠陽蹻實為申脉本非附陽陰蹻

實為照海本非交信有髑之名扁骨見於外臺懸鍾
之名絕骨童子髀之名前關見於千金注如此者衆
可不審處而鍼灸耶苟不審處則差之毫釐有尋丈
之謬矣於是舉其畧以示世醫俾之謹於求穴云

點穴

千金云人有老少體有長短膚有肥瘦皆須精思商
量準而折之又以肌肉文理節解縫會宛陷之中及
以手按之病者快然如此子細安詳用心者乃能得

之耳許希亦云或身短而手長或手長而身短或胃腹短或胃腹長或瘠或肥又不可以一槩論也

千金云凡點灸法皆須平直四體無使傾側灸時恐

穴不正徒破好肉爾

明堂云須得身體平直四支無令拳縮坐點無令俛仰立點無

令傾側若坐點則坐灸卧點則卧灸立點則立灸反此

則不得其穴

千金云凡灸當先陽後陰言從頭向左而漸下次後從頭向右而漸下先上後下

明堂下云先灸於上後灸於下先灸於少後灸於多
皆宜審之

論壯數多

千金云凡言壯數者若丁壯病根深篤可倍於方數

老少羸弱可減半

又云小兒七日以上周年
以還不過七壯炷如雀屎

扁鵲灸

法有至五百壯千壯曹氏灸法有百壯有五十壯小
品諸方亦然惟明堂本經多云鍼入六分灸三壯更
無餘論故後人不準惟以病之輕重而增損之凡灸

頭頂止於七壯積至七七壯止

銅人

若治風則灸上星

前頂百會皆至二百壯腹背宜灸五百壯若鳩尾巨

闕亦不宜多四支但去風邪不宜多灸灸多則四支

細而無力

明上

而千金於足三里穴乃云多至三二百

壯心俞禁灸若中風則急灸至百壯皆視其病之輕

重而用之不可泥一說而久不知其有一說也下經

只云若是禁穴明堂亦許灸一壯至三壯恐未盡也

千金云凡官遊吳蜀體上常須三兩處灸之切令瘡

暫差則瘴癘溫瘧毒氣不能著人故吳蜀多行灸法
有阿是之法言人有病即令捏其上若裏當其處不
問孔穴即得便快成痛處即云阿是灸刺皆驗故曰
阿是穴

艾炷大小

千金云黃帝曰灸不三分是謂徒冤炷務大也小弱
乃小作之

又云小兒七日以上周年
以還不過七壯炷如雀糞

明堂下經云凡

灸欲艾炷根下廣三分若不三分即火氣不能遠達

病未能愈則是艾炷欲其大惟頭與四支欲小爾至明堂上經乃云艾炷依小竹筯頭作其病脉麤細狀如細線但令當脉灸之崔冀大炷亦能愈疾又有一途如腹內疝瘕瘰癧塊伏梁氣等惟須大艾炷故小品曰腹背爛燒四支則但去風邪而已如巨闕鳩尾雖是胃腹穴灸之不過四七炷祇依竹筯頭大但令正當脉灸之艾炷若大復灸多其人永無心力如頭上灸多令人失精神臂脚灸多令人血脉枯渴四支

細而無力既失精神又加於細即令人短壽

見承此
漿穴

論甚當故備著之

點艾火

下經云古來灸病忌松柏枳橘榆棗桑竹八木切宜避之有火珠曜日以艾承之得火次有火鏡耀日亦以艾引得火此火皆良諸蕃部落用鎖鐵擊碯石得火出以艾引之凡人卒難備即不如無木火清麻油點燈燈上燒艾莖點灸是也兼滋潤灸瘡至愈不疼

痛用蠟燭更佳

良方云凡取火者宜敲石取火

今舟行人以鐵鈍刀擊石穴以紙灰為火

丸在下承之亦得火

或水精鏡於日得太陽火為妙天陰則以

槐木取火

治灸瘡

下經云凡著艾得瘡發所患即差不得瘡發其疾不愈甲乙經云灸瘡不發者用故履底灸令熱熨之三日即發今用赤皮葱三五莖去青於燂火中煨熟拍

破熱熨瘡十餘遍其瘡三日自發予見人灸不發者
頻用生麻油清之而發亦有用皂角煎湯候冷頻點
之而發亦有恐氣血衰不發於灸前後煎四物湯服
以此湯滋養氣血故也蓋不可一槩論也予嘗灸三
里各七壯數日過不發再灸兩壯右足發左足不
發更灸左足一壯遂發兩月亦在人以知取之若任
其自然則終不發矣此人事所以當盡也

凡著灸住火便用赤皮葱薄荷煎湯溫洗瘡周回約

一二尺令驅逐風氣於瘡口出兼令經脉往來不滯

自然瘡壞疾愈

今人亦有恐水殺人不用湯淋

若灸瘡退火痂後用

東南桃枝青嫩柳皮煎湯溫洗能護瘡中諸風若瘡
內黑爛加胡荽煎若瘡疼不可忍多時不效加黃連
煎神效

凡貼灸瘡春用柳絮夏用竹膜秋用新綿冬用兔腹
上白細毛猫兒腹毛更佳今人多以膏藥貼之日三
兩易全不疼但以膏藥貼則易乾爾若要膿出多而

疾除不貼膏藥尤佳

忌食物

既灸忌猪魚熱麵生酒動風冷物雞肉最毒而房勞尤當忌也

下經云灸時不得傷飽大飢飲酒食生硬物兼忌思慮憂愁恚怒呼罵呼嗟歎息等

今下里人灸後亦忌飲水將水濯手足

避人神等

千金云欲行鍼灸先知行年宜忌及人神所在不與

禁忌相應即可故男忌除女忌破男忌戌女忌巳有
日神忌有每月忌有十二時忌有四季人神有十二
部人神有十二部年人神有九部旁通人神有雜忌
旁通又有所謂血支血忌之類凡醫者不能知此避
忌若逢病人厄會男女氣怯下手至困通人達士豈
拘此哉若遇急卒暴患不拘此法許希亦云若人病
卒暴宜急療亦不拘此故後之醫者亦云卒暴之疾
須速灸療一日之間止忌一時是也

千金云癰疽下腫喉痺客忤尤為急凡作湯藥不可
避凶日覺病須臾即宜便治又曰凡人卒暴得風或
中時氣凡百所苦須急救療漸久後皆難愈此論甚
當夫急難之際命在須臾必待吉日後治已淪於鬼
錄矣此所以不可拘避忌也惟平居治病於未形選
天德月德等日服藥鍼灸可也

相天時

千金云日正午以後乃可灸謂陰氣未至灸無不著

午前平旦穀氣虛令人癲眩不可鍼灸卒急者不用
此例

下經云灸時若遇陰霧大風雪猛雨炎暑雷電虹霓
暫停候晴明即再灸急難亦不拘此

鍼灸資生經卷二

欽定四庫全書

鍼灸資生經卷三

虛損

腦虛冷腦衄風寒入腦久遠頭疼等疾宜灸顙會

予年踰壯洎寒夜觀書每覺腦冷飲酒過量腦亦疼甚後因灸此穴而愈有兵士患鼻衄不已予教令灸此穴即愈有人久患頭風亦令灸此穴即愈但銅人明堂經只云主鼻塞不聞香臭等疾而已故予書此

以補其治療之闕然以腦戶不宜鍼觀之顙會亦不宜鍼鍼經止云八歲以下不宜鍼恐未盡也

凡飲食不消心腹膨脹面色萎黃世謂之脾腎病者宜灸中腕

諸葛亮夙興夜寐罰至二十皆親覽而所噉食不至數升司馬仲達知其將死既而亮卒仲達追之楊儀反旗鳴鼓若將拒馬仲達乃退不敢逼百姓為之諺曰死諸葛走生仲達仲達聞之曰吾便料生不便料

死故也其曰料生蓋料其事多而食不如前死之兆也食不如前仲達且知諸葛之且死今人飲食減少是胃氣將絕不可久生矣方且常食堅硬使愈難剋化服峻補藥使脾胃反熱愈不能食初不知灸中脘等穴以壯脾胃亦惑之甚也

難經論四時皆以胃氣為本釋者日言三臟皆

以胃氣為本胃者水穀之府人須仰胃氣為生也然則欲全生者宜灸胃脘

久冷傷億藏府洩利不止中風不省人事等疾宜灸神

闕

舊傳有人年老而顏如童子者蓋每歲以鼠糞灸臍中一壯故也予嘗久患溏利一夕灸三七壯則次日不如廁連數夕灸則數日不如廁足見經言主洩利不止之驗也又予年踰壯覺左手足無力偶灸此而愈後見同官說中風人多灸此或百壯或三五百壯皆愈而經不言主中風何也

藏氣虛憊真氣不足一切氣疾久不差者宜灸氣海

銅

人身有四海氣海血海照海髓海是也而氣海為第

一氣海者元氣之海也人以元氣為本元氣不傷雖疾不害一傷元氣無疾而死矣宜頻灸此穴以壯元陽若必待疾作而後灸恐失之晚也

府藏虛乏下元冷憊等疾宜灸丹田

人有常言七七之數是旁太歲壓本命六十有一是太歲壓本命人值此年多有不能必者是固然矣然傳不云吉人吉其凶者乎常觀素問以六八之數為

精髓竭之年是當節其欲矣

千金云五十者一月一泄要之四十八便當依

此千金載素女論六十者閉精勿泄是欲當絕矣宜

節不知節宜絕不能絕坐此而喪生蓋自取之豈歲

之罪哉人無罪歲則雖有孽猶可違矣所謂吉其凶

者如此雖不灸丹田可也

丹田可灸七七壯或三百壯

陽氣虛憊失精絕子宜灸中極

中極一名氣原蓋氣之原也人之陽氣虛憊者可不

灸此以實其氣耶

按難經云丹田亦名大中極言丹田取人之身上下四旁最為中間

也故名為極此亦曰中極其去丹田只一寸雖未若丹田之最中然不中不遠矣

三里治胃寒心腹脹滿胃氣不足惡聞食臭腸鳴腹痛

食不化

銅

秦承祖云諸病皆治

華佗云療五勞羸瘦

七傷虛乏胃中瘀血乳癰外臺

明堂云人年三十以

上若不灸三里令氣上衝

明下云
眼睛

千云主陰氣不足

小腹堅熱病汗不出口苦壯熱身反折口噤腰痛不可

顧胃氣不足久泄利食不化脇下注滿不能久立狂言

狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽悽惡寒云云

凡此等疾皆刺灸之多至五百壯少至二三百壯

小品云四支但去風邪不宜多灸七壯至七七壯止
不得過隨年數故銅人於三里穴止云灸三壯鍼五
分而已明堂上經乃云日灸七壯止百壯亦未為多
也至千金方則云多至五百壯少至二三百壯何其
多耶要之日灸七壯或艾炷甚小可至二七壯數日
灸至七七壯止灸瘡既乾則又報灸之以合乎若要
安丹田三里不曾乾之說可也必如千金之壯數恐
犯小品之所戒也予舊有腳氣疾遇春則足稍腫夏

中尤甚至冬腫漸消偶夏間依素問注所說穴之所
在以溫鍼微刺之翌日腫消其神效有如此者謬刺
且爾況於灸乎有此疾者不可不知此不止治足腫
諸疾皆治云

涌泉治心痛不嗜食婦人無子男子如蠱女子如妊娠
千作五指端盡痛足不得履地宜針灸銅千云至忽忽

喜忘身體腰脊如解大便難小便不利足中清至膝咽
中痛不可內食瘡不能言衄不止云云

千金於諸穴皆分主之獨於膏肓三里涌泉穴特云
治雜病是三穴者無所不治也但明堂云若灸廢人
行動爾既欲愈疾雖不行動數日未為害也

脾俞治食多身瘦洩利體重四支不收腹痛不嗜食

銅

胃俞治胃寒腹脹不嗜食羸瘦

銅

人之言曰血氣未動者瘠甚而不害血氣既竭者雖
肥而死矣則身之羸瘦若未足為人之害者殊不知
人之羸瘦必其飲食不進者也飲食不進則無以生

榮衛榮衛無以生則氣血因之以衰終於必亡而已
故難經疏云人仰胃氣為主是人資胃氣以生矣五
藏論云脾不磨食不消是脾不壯食無自而消矣既
資胃氣以生又資脾以消食其可使脾胃一日不壯
哉必欲脾胃之壯當灸脾胃俞等穴可也

心中風狂走發癇語悲泣心胃悶亂欬唾血宜針心俞

銅

難經疏言心為藏府之主法不受病病則神去氣竭

故手足為之清

手足節冷

名真心痛旦發夕死手足溫者

名厥心痛可急治也故千金言心中風者急灸心俞
百壯服續命湯必泥心俞不可灸之說則無策矣但
心俞雖可鍼若刺中心一日必死又豈易鍼耶必欲
無此患平居當養其心使之和平憂愁思慮不使傷
其神乃策之上必不免此亦當服鎮心丹等藥補助
乃其次也

腎俞治虛勞羸瘦腎虛水藏久冷小便濁出精陰中疼
五勞七傷虛憊足寒如冰身腫如水

銅

難經疏云夾脊骨有二腎在左為腎在右為命門言
命門者性命之根本也其穴與臍平凡灸腎俞者在
平處立以杖子約量至臍又以此杖子當背脊骨上
量之知是與臍平處也然後相去各寸半取其穴則
是腎俞穴也更以手按其陷中而後灸之則不失穴
所在矣凡灸以隨年為壯灸固有功亦在人滋養之
如何爾人當愛護丹田吾既於既效方論之詳矣而
妻妾之戕害蓋未之及也君子脩老之序曰夫人淫

亂失事君子之道故陳人君之德服飾之盛宜與君子偕老也宜偕老而不至偕老夫人之罪多矣故詩人以是刺之意可見也至於士夫志得意滿不期驕而驕至侍妾數十人少亦三五輩淫言褻語不絕于耳不能自克而淫縱其欲者多矣為內子者恬不之怪人有問之者則曰自母言之則為賢母自我言之未免為妬婦人也人或以此多之其夫亦以為賢而不妬孰知其不妬乃所以為禍之歟雖然二南之化

至於無妬忌而止今而言此豈求異於詩人耶是不
然古人十日一御荀子彼其不妬者蓋使媵妾得備
十日一御之數爾不妬則同所以不妬則異吾故表
而出之以為夫婦之戒固非求異於詩人也

曲骨主失精五藏虛竭灸五十壯千明下云但是虛乏
冷極皆宜灸

骨髓冷疼灸上廉七十壯千

難經疏八會曰府會中管治府之病藏會章門藏病

治此筋會陽陵泉筋病治此髓會絕骨髓病治此血
會鬲俞血病治此骨會大杼禁灸骨病治此脉會太淵
脉病治此氣會亶中氣病治此然則骨髓有病當先
大杼絕骨而後上廉可也

膀胱三焦津液少大小腸寒熱見腰或三焦寒熱灸小

腸俞五十壯千三焦膀胱腎中熱氣灸水道隨年千

膏肓俞主無所不療羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆發
狂健忘等疾

膏肓俞無所不療而古人不能求其穴是以晉景公
有疾秦醫曰緩者視之曰在肓之上膏之下攻之不
可達之不及藥不至焉不可為也晉侯以為良醫而
孫真人乃笑其拙為不能尋其穴而灸之也若李子
豫之赤龍丹又能治其膏肓上五音下之鬼無待於
灸也是緩非特拙於不能灸亦無殺鬼藥矣其亦技
止於此哉

灸二十種骨蒸

崔知悌序云骨蒸病者亦名傳尸亦謂殭殍亦稱復連亦曰無辜丈夫以精氣為根女人以血氣為本無問老少多染此疾予嘗三十日灸活十三人前後差者數踰二百非止單攻骨蒸又別療氣療風或瘴或勞或邪或癖病狀既廣灸活者不可具錄灸後宜服治勞地黃元良

凡取四花穴以稻稈心量口縫如何闊斷其長多少以如此長裁紙四方當中剪小孔別用長稻稈踏脚

下前取脚大指為止後取脚曲踈橫文中為止斷了
却環在結喉下垂向背後看稭止處即以前小孔紙
當中安分為四花蓋灸紙四角也又一醫傳一法先
橫量口吻取長短以所量草就背上三推骨下直量
至草盡處兩頭用筆點了再量中指長短為準却將
量中指草橫直量兩頭用筆圈四角其圈者是穴
不是可灸七七壯止

勞瘵

傳尸

骨蒸

羸瘦

中膠治丈夫五勞七傷六極腰痛大便難小便淋瀝腹
脹下利食洩銅三里治五勞羸瘦七傷虛乏明下云

五勞虛乏四支羸瘦肩井治五勞七傷大椎治五

勞七傷溫瘧瘵瘧氣症背膊急頸項强明上風勞食氣

下同

肺俞治寒熱喘滿虛煩口乾傳尸骨蒸勞肺痿欬嗽

明云療肉痛皮癢傳尸骨蒸肺嗽魄戶治虛勞肺

痿明云勞損痿黃五尸走疰項强明下云療勞損虛乏秦承

祖云支正療五勞四支力弱虛乏等明諛諛療勞損虛

乏不得睡 下焦俞療背痛身熱 曲骨但是虛乏冷

極皆灸 氣海療冷病面黑肌體羸瘦四支力弱小腹

氣積聚責豚腹弱脫陽欲死不知人五藏氣逆上攻

膏肓俞治羸瘦虛損夢中失精無所不療銅 腎俞治虛

勞羸瘦耳聾腎虛水藏久冷明有腰痛 心腹膨脹脅滿引小

腹痛目視眈眈少氣溺血小便濁出精陰疼五勞七傷

虛僊脚膝拘急明有好獨卧 足寒如冰頭重身熱振慄腰中

四支淫灤洞洩食不化身腫如水 明下云療身寒熱

食多身羸瘦面黃黑目眊眊女久積冷氣成勞 腦空

治勞疾羸瘦體熱頸項強 章門治傷飽身黃羸瘦

漏谷治食不為肌膚

下管治日漸羸瘦

見瘕

下管見腹

脹

胃俞

見虛損

脾俞

下廉

見殮洩

治羸瘦小兒羸瘦食飲

少不生肌膚灸胃俞一壯

明下

灸勞法其狀手足心熱多盜汗精神困頓骨節疼痛寒初

發咳嗽漸吐膿血肌瘦面黃減食少力令身正直用草

子男左女右自脚中指尖量過脚心下向上至曲踈大

紋處截斷却將此草自鼻尖量從頭正中

須分開頭心髮貼肉量

至脊以草盡處用墨點記別用草一條令病人自然合

口量闊狹截斷却將此草於墨點上平摺兩頭盡處量

穴灸時隨年多灸一壯

如年三十灸三十一

累效

集

羸瘦固瘵疾自有寒熱等證宜隨證醫治若素來清

癯者非有疾也惟病後瘦甚久不復常謂之形脫與

夫平昔充肥忽爾羸瘦飲食減少者或有他疾乘之

則難救療須辨之於早而著艾可也然仲景論六極

必曰精極令人氣少無力漸漸內虛身無潤澤翕翕
羸瘦眼無精光且云八味腎氣差六極而差五勞則
是八味丸所當服

仲景常服或常服
去附子加五味子

而腎俞等穴尤

所當灸也

脾俞大腸俞主腹中氣脹引脊痛食多身羸瘦名曰食
晦先取脾俞後取季肋 五藏六府心腹滿腰背痛飲
食吐逆寒熱往來小便不利羸瘦少氣灸三焦俞隨年
千

腎虛

腎俞治腎虛水藏久冷

銅見勞明同

中膂俞治腎虛消渴

見竭

陽蹻療腎氣

明

下廉療小腸氣不足面無顏色灸小腸

氣瘕癖氣發時腹痛苦若刀刺不可忍者并婦女本藏氣

血癖走疰刺痛或坐卧不得或大小便不通可思飲食

於左右脚下第二指第一節曲紋中心各灸十壯每

壯如赤豆大甚驗

集効一云治寒病腎腸氣發牽連外腎大痛腫硬如石

治小腸氣方甚多未必皆效耆域方奪命散良方倉

猝散皆已試之效者有一兵患小腸氣依此方灸足
第二指下文五壯畧效而再發恐壯數未多也予以
鎮靈丹十粒與之令早晚服五粒而愈灸固捷於藥
若灸不得穴不如藥相當者見效之速且灸且藥
方為當爾 近傳一立聖散用金乾蝎七枚縮砂仁
三七枚炒茴香一錢為末分三服熱酒調下和滓空
心服此疾是小腸受熱蘊積不散久而成疾服此立
效雖未試用以其說有理故附于此有士人年少覓

灸夢遺為點腎俞痠疼其令灸而愈則不拘老少腎
皆虛也古人云百病皆生于心又云百病皆生于腎
心勞生百病人皆知之腎虛亦生百病人未知也蓋
天一生水地二生火腎水不上升則心火不下降茲
病所由生也人不可不養心不愛護腎乎

消渴

消腎

消中

商丘主煩主渴

干

意舍主消渴身熱面目黃

明同

承漿

明下

云飲水不休

意舍關衝

然谷主消渴嗜飲

隱白主飲渴

勞宮主苦渴食不下 曲池主寒熱渴 行間 太

衝主噎乾善渴

並

意舍

見腹

中膺俞治腎虛消渴汗不

出

明作汗出

腰脊不得俛仰腹脹脇痛

銅

兌端治小便黃舌

乾消渴

然谷治舌縱煩滿消渴

水溝治消渴飲水

無度

明

陽綱療消渴

明下見腸鳴

古方載渴病有三曰消渴曰消中曰消腎消腎最忌

房事李祠部必云腎虛則消渴消中亦當忌也張仲

景云宜服八味丸或服之不效者不去附子也有同

舍患此人教服去附子加五味子八味丸即效有同

官患此予教服千金枸杞湯效坡文載眉山張醫治

楊穎臣渴病

見坡

麝香當門子酒漬作十九取枳枸

俗謂

雞距子亦曰癩漢指頭

作湯飲之愈張云消渴消中皆脾衰而

腎敗土不能勝水腎液不上汝乃成此疾今診楊脾

極巨脉熱而腎衰當由果實過度虛熱在脾故飲食

兼人而多飲水水多故溺多非消渴也麝香能敗酒

瓜果近輒不植屋外有枳枸木屋中釀酒不熟故以

二物去酒果毒其論渴有理故載于此

凡消渴經百日以上不得灸刺灸刺則於瘡上漏膿水
不歇遂致癰疽羸瘦而死亦忌有所誤傷初得患者可
如方刺灸若灸諸陰而不愈宜灸諸陽

詳見千金
有數十穴

陰痿縮 兩丸騫

陰谷主陰痿小腹急引陰內廉痛

千

大赫 然谷主精

溢上縮 太衝主兩丸騫縮腹堅不得卧

甲云臍環痛
陰騫兩丸縮

石門主小腹堅痛下引陰中不得小便兩丸騫 陰交

主腹膜堅痛引陰中不得小便兩丸騫陰縮灸中封

大赫

見失精

中封主痿厥

見症

曲泉主不尿陰痿

氣衝治陰痿莖痛

千同

兩丸騫痛不可忍

銅

五樞

見症

歸來治卵縮

見陰痛

筋攣陰縮入腹相引痛灸中封五十壯或不滿五十壯
老少加減又云此二穴喉腫厥逆五藏所苦鼓脹並主
之

陰挺出

大敦主陰挺出

少府主陰挺長

千並見疝

上膠

千見絕子治

婦人陰挺出不禁

銅

陰蹻

照海

見淋

水泉

見月事

曲

泉

見瘕癖千同

治婦人陰挺出

陰蹻

見淋

療陰挺出

明

轉胞

涌泉主胞轉

千見淋

關元主婦人胞轉不得尿

見無子又主胞

閉塞銅云治胞轉不得尿

腰痛小便不利苦胞轉灸中極七壯

小兒同

又灸十五椎或臍下一寸或四寸隨年

凡飽食訖忍小

便或走馬或忍小便入房或大走皆致胞轉臍下急滿

不通

方見千金

凡尿不在胞囊中為胞屈僻津液不通葱

葉除尖頭內陰莖孔中深三寸微用口吹胞脹津通愈

陰莖疼

曲泉

見症

行間主癰閉莖中痛

千

氣衝主陰痿莖痛

烈缺

見失精

陰陵泉

少府主陰痛

歸來主賁豚

卵上入引莖痛

歸來治小腹賁豚卵縮莖痛

銅

橫

骨治陰器縱伸痛

見淋

水道治小腹滿引陰痛

見小腹滿

氣衝治莖痛

見陰痿

會陰治陰中諸病前後相引痛不

欽定四庫全書

針灸清生錄
卷三

得大小便陰端寒衝心

大敦治陰頭痛

見症

腎俞

見勞

志室

見陰腫

陰谷

見溺難

太衝

見小便不利

治陰痛

千金翼云七傷為病小便赤熱乍數時難或時傷多

或如鍼刺陰下常濕陰痿消小精清而少連連獨洩

陰端寒冷莖中疼痛云云

當早服藥著艾

莖中痛灸行間三

十壯

膀胱氣

章門療膀胱氣癖疝瘕氣膀胱氣痛狀如雷聲積聚氣

明岐伯灸膀胱氣攻衝兩脇時臍下鳴陰卵入腹灸臍

下六寸兩旁各寸六分三七壯五樞療膀胱氣攻兩

脇下膀胱冷灸之如腎虛法千膀胱三焦津液少大小

腸寒熱見腰或三焦寒熱灸小腸俞五十壯三焦膀

胱腎中熱氣灸水道隨年壯水道治小腹滿引陰中

痛腰背急膀胱有寒三焦結熱小便不利

千金云氣衝主癰明堂云氣衝療癰疔是癰疔即癰

也必用云治水癰偏大上下不定疼不可忍俗呼為

膀胱氣是膀胱氣即癰疽也然太倉公診命婦云疽
氣客于膀胱難于前後洩而溺赤又不可便認膀胱
氣為疽氣云

陰汗 濕癢

會陽治陽氣虛乏陰汗濕 銅 魚際 見寒熱 療陰汗 明 千云

主陰濕腹中餘疾 中極 陰蹻 腰尻交 陰交

曲泉主陰癢 千 會陰主陰頭寒 少府主陰癢 見

仲景論七傷曰一陰汗二精寒三精清四精少五囊

下濕癢六小便數七夜夢陰人然則陰汗陰濕癢者

蓋七傷之數也可不早治之乎

有人作文字則氣濕亦心氣使然心腎相

為表裏故也

千金翼敘虛損云疾之所起生自五勞即生六極

詳見

寒熱復生七傷一陰寒二陰痿三裏急四精連連不絕

五精少囊濕六精清七小便數

其病小便赤熱或如鍼刺陰痿小陰下常

濕精清而少云云論與仲景少異故載之於此

陰腫

陰瘡

曲泉

見無子

陰蹻

見漏下

大敦

氣衝

見症

主陰腫

千

志

室肫育療陰痛下腫

明

崑崙在外踝後跟骨上治陰腫

銅

明

下云內崑崙在內踝後五分筋骨間療小兒陰腫灸三

壯

曲泉治陰腫斷痛

見風勞

氣衝治婦人陰腫

見月事

又

療陰腫

明下見症

膀胱俞治陰生瘡

見便赤

有人陰腫醫以赤土塗之令服八味丸而愈一小兒

陰腫醫亦以赤土塗之愈

今人用寫字油柱木用

若久病而陰

腫病已不可救宜速灸水分穴蓋水分能分水穀水

穀不分故陰腫不特陰腫他處亦腫也尤宜急服禹

餘糧丸云

見既效方

小腹痛

陰蹻療小腹偏痛嘔逆嗜卧

明

中極療小腹痛積聚堅

如石小便不利失精絕子面黧

下

腎俞

復溜

中封

承筋陰包

承山

大敦主小腹痛

千

石門

商丘

主小腹堅痛下引陰中

石門

水分主小腹痛拘急痛

涌泉主風入腹中小腹痛臍中等主小腹痛氣痛

見

大谿主小腹熱而偏痛

肝俞

是欬逆

小腸俞

見便赤

蠱溝

照海

見症

下廉

見發洩

丘墟

見腫脹

中都

見鳴

治小腹痛

銅

太衝治腰引小腹痛

帶脉治婦人小腹堅痛月脉不

調帶下赤白裏急瘕瘕

五樞主小腹痛

見症

曲泉主女

子小腹痛

無子

婦人陰痛引心下

小腹絞痛灸膝外邊上去一寸宛宛中千翼

小腹脹滿

大巨治小腹脹滿煩渴癢症偏枯四支不舉

銅

曲骨治

小腹脹滿小便淋澀不通癢症小腹痛然谷治小腹

脹

見症

幽門治小腹脹滿嘔沫吐涎喜噦

京門

見腸鳴

蠡溝

見症

中封治小腹腫

見瘡

胞肓治小腹堅急

見腹痛

水道治

小腹滿引陰中痛腰背強急膀胱有寒三焦結熱小便

不利大敦治小腹痛中熱喜寐小便不利小腹胀滿

虛乏灸小腸俞隨年

千

五藏虛勞小腹弦急脹熱灸腎

俞五十壯老小損之若虛冷可百壯委中主小腹堅

腫

銅人云小腸俞治小便赤澀淋瀝小腹痛千金亦云

治小腹脹滿此治小腹脹痛要穴也若灸不效方灸
其他穴云

癰症

諸症氣

胎症

寒症

卒症

必用方云治水癰偏大上下不定疼不可忍俗呼為
膀胱氣用煨過牡蠣二兩炮乾薑一兩為末塗病處
即愈則是水癰即膀胱氣也千金云氣衝主癰明堂
下經云治瘡症則是癰即瘡症也恐人惑其名而誤
治之故為之辯

曲泉主癰疽陰跳痛引臍中千中都合陽中郛

關元大巨交信中封太衝地機主癰疽中

封主癰疽癰疽暴痛痿厥少府主陰痛實時挺長寒熱

陰暴痛遺尿偏虛則暴癢氣逆卒疝小便不利衝門

主婦人陰疝商丘主陰股內痛氣癰狐疝走上下引

小腹痛不可俛仰巨闕主狐疝太衝主狐疝歐厥

肩井旁肩解與臂相接處主偏癰氣衝主癰陰腫

痛中管主衝疝冒死不知人交信主氣癰癰疽陰

急股樞膊內廉痛 臍中 石門 天樞 氣海主小

腹疝氣遊行五藏疝繞臍衝胃不得息並臍疝繞臍痛

衝胃不得息灸臍中 臍疝繞臍痛石門主之 臍疝

繞臍痛時止天樞主之又主氣疝煩嘔千金主面腫責

豚並氣衝主癰明下作陰腫痛陰痿莖中痛兩丸騫痛

不可仰卧 五樞主陰疝兩丸上入小腹痛明下云主

陰疝小腹痛 陰交 石門 太衝主兩丸騫見陰交信

淋見中都見腸鳴 大巨 曲骨見小腹 治癰疝銅 曲泉治大

夫癰疽陰股痛小便難腹脅支滿癰閉少氣洩利四支
不舉實即身熱目眩痛汗不出目眈眈膝痛筋攣不可
屈伸千金曰癰有四種腸癰卵脹難灸氣癰水癰鍼灸
易治卵偏大上入腹灸三陰交隨年卵偏大癰病灸關
元百壯或大敦隨年壯或橫骨邊二七壯夾莖是

詳見千金

築賓治小兒胎疝

明下

痛不得乳

小兒胎疝卵偏重

灸囊後縫十字文當上三壯春較夏灸秋較冬灸 太

衝主女子疝及小腹腫澹泄癰遺尿陰痛面黑目眈痛

涌血

十

蠱溝主女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛

陰交 石門主疝

見無子

小兒氣癰灸足厥陰大敦左灸

右灸左各一壯太倉公診司空命婦曰疝氣客于膀胱

難于前後洩而溺赤灸其足蹶陰脉左右各一所即

不遺溺而洩清

更為火齊湯飲之而疝氣散

陰市肝俞療寒疝下至

腰脚如冷水水傷諸疝按之在膝上伏兔下寒痛腹脹

滿厥少氣明下云卒疝小腹痛力痿氣少伏兔中寒腰

如冷水銅云寒疝小腹脹腰以下伏兔上寒如冷水

合陽治寒疝陰偏痛

銅

然谷治寒疝小腹脹上搶胃脇

次膠治疝氣下墜腰脊痛不得轉搖急引陰器痛不

可忍腰下至足不仁背膝寒小便赤淋心下堅脹 大谿

行間

見白濁

盲俞

見腹脹

肝俞治寒疝

見欬明同

陰交治寒

疝引小腹痛腰膝拘攣

五樞治男子寒疝卵上入小

腹痛 中封治寒疝引腰中痛或身微熱 大敦主寒

疝陰挺出

見下

舍弟少戲舉重得偏墜之疾有客人為當關元兩旁

相去各三寸青脉上灸七壯即愈王彥賓患小腸氣

亦如此灸之愈

餘見膀胱

金門

見尸厥

丘墟

見腋腫

治暴疰痛

大敦治卒疰小便數

遺溺陰頭中痛心痛汗出陰上入腹陰偏大腹臍中痛

悵悵不樂病左取右病右取左

蠡溝治卒疰小腹腫

時小腹暴痛小便不利如癰閉數噫恐悸少氣不足腹

痛悵悵不樂咽中悶如有息肉背拘急不可俛仰 太

衝治小兒卒疰嘔逆發寒咽乾肘腫內踝前痛淫瀝斷

痠腋下腫 明下云療卒疝小腹痛小便不利如淋

照海治卒疝小腹痛嘔吐嗜卧 陰蹻療卒疝小腹痛

上左取右右取左立已明 蠡溝療卒疝小股腫小便不

利交儀同 臍下積氣如卵石足寒脛酸屈伸難下 石門療

卒疝繞臍痛 關元療卒銅作暴千同 疝小腹痛轉胞不得

小便 陷谷療卒疝小腹痛 交信見淋 療卒疝 華池

療卒陰卵偏大取足大指去甲五分內側白肉際灸三

壯炷如半棗核左取右右取左 照海主四支淫灤身

悶陰暴起疝^千

大敦主卒疝暴痛陰跳上入腹寒疝陰

挺出偏大腫臍腹中悒悒不樂小便難而痛灸刺立已

左取右右取左

甲云照海主之

疝瘕

餘見瘕癖

陰陵泉治疝瘕小便不利氣淋

銅

千云主婦人疝瘕按

之如以湯沃股內至腰殄泄陰痛小腹痛堅急下濕不

嗜食

太谿主胞中有大疝瘕積聚與陰相引

千

太陰

郄衝門主疝瘕陰疝

四滿主臍下疝積

甲云胞中有血

石

門主腹滿疝積

四滿

見積聚

中極治疝瘕

府舍治疝

癖

見脾疼

瘕聚灸氣海天樞百壯

並見腹脹

丘墟主大疝腹堅

關元治瘕聚

見赤白帶

帶下灸間使三十又淋小便赤尿

道痛臍下結塊如覆盆或因食得或因產得惡露不下

遂成疝瘕或因月事不調血結成塊皆鍼之

千金翼

淋瘕

淋瀝

餘見小便不通

關元主胞閉塞小便不通勞熱石淋又主石淋臍下三

十六疾不得小便并灸足太陽懸鍾主五淋大敦

氣門主五淋不得尿 氣衝主腹中滿熱淋閉不得

尿 交信主氣淋 復留主血淋 明下云療五淋小

便如散灰色 關元 涌泉主胞轉氣淋 長強 小

腸俞主淋癰 關元 陰陵泉主腎病不可俛仰氣癰

曲泉主癰閉 行間主癰閉莖中痛 然谷主癰疝

曲骨主小腹脹血癰小便難 包肱秩邊主癰閉下

重不得小便 陰蹻主女子淋

明云療諸淋見淋瀝

石門療氣淋

小便黃_下 長強療五淋 曲骨療五淋小便黃 至陰

療小便淋失精

下

中極治五淋小便赤澀

明下又云尿道痛

失精臍下結如覆杯陽氣虛僊

銅

復溜治五淋小便

如散火

次膠治赤淋

見便不利

然谷

曲骨治淋瀝

見

腹痛

太衝治淋

陰陵泉治氣淋寒熱不節

交信治

氣淋癢疝陰急股引臍內廉骨痛 明云療氣淋卒疝

大小便難

箕門治淋遺溺鼠鼯腫痛小便不通

大

鍾治實則小便淋閉洒洒腰脊強痛大便秘澀嗜卧口

中熱虛則嘔逆多寒欲閉戶而處少氣不足胃脹喘息

舌乾咽中食噎不得下善驚恐不樂喉鳴欬唾血氣淋

灸關元五十壯或鹽著臍中灸三壯千石淋灸關元或

氣門或大敦各三十壯勞淋灸足太陰百壯血淋灸丹

田或伏留各隨年五淋不小便中封二七壯或大敦七

壯

餘見千金

水泉治女小便淋瀝

委陽

志室

見陰痛

中膠治小便淋瀝

陰蹻療婦人淋瀝陰挺出

銅同

四支

淫灤心悶及諸淋

明

關元

明

治不覺遺瀝

銅見臍痛

小

腸俞治淋瀝

見小便赤

予壯年寓學忽有遺泄之患因閱方書見有用五倍
子末酒調服者服之而愈藥若相投豈在多品而亦
無事於灸也故附著于此若欲治淋疾則有王不留
行子神效彭侍郎以治張道士服三粒愈見既效方有婦
人患淋卧病久之服諸藥愈甚其夫入夜來告急予
令取此花葉十餘葉令研細煎服翌朝再來云病已
減八分再與數葉煎服即愈一名剪金花一名金盞銀臺

小便難 不通 不利

涌泉療小便不通

明

曲骨療婦人小便不通

下見帶下

曲泉主陰跳痛引莖中不得尿

十

陰交 石門

委

陽主小腹堅痛引陰中不得小便 關元主三十六疾

不得小便 氣衝主淋閉不得尿 大敦主小便難而

痛

甲云照海主之

橫骨 大巨 期門主小腹滿小便難陰

下縱 陰谷 大敦 箕門 委中 委陽主陰跳遺

小便難 中封 行間主振寒洩白尿難痛 曲骨主

小腹脹血癰小便難 烈缺主小便熱痛 中極等

見失

精

承扶

屈骨端主小便不利

見大便不禁

少府 三

里主小便不利癰

陰陵泉主心下滿寒中小便不利

包育等

見淋

石門

關元

陰交

中極

並見無子

曲

骨

見帶下

主不得小便

京門主溢飲水道不通溺黃

太衝治腰引小便痛小便不利狀如淋

明同

癰疽小腹腫

溇洩遺溺陰痛面目蒼色胃脇支滿足寒大便難

銅

水道治膀胱寒三焦熱小便不利

見小腹

會陰治小便

難竅中熱

同

皮痛陰端寒衝心

橫骨治腹脹小便

難陰器縱伸痛

陰包

見腰

至陰

陰陵泉

見疝

地機

見水腫

三陰交

見瘕癖

治小便不利

箕門

見淋

治小便不

通

陰谷治煩逆溺難小腹急引陰痛股內廉痛五

里治腸中滿熱閉不得溺

行間治溺難

見白濁

有人小便淋澁不通甚以為苦予令摘王不留行葉

詳見淋瀝研細煎服即愈

黃耆椎破水煎數沸服治大小便不通立效亦有多煎葱湯浸

臍以下得通

小便五色

腎俞主小便難赤濁骨寒熱十前谷委中主尿赤

難上廉下廉主小便難黃凡尿青取并黃取俞

赤取榮白取經黑取合承漿主小便赤黃或時不禁

完骨小腸俞白環俞陽綱膀胱俞主小便赤

黃中管主小腸有熱尿黃關元主腎病氣癰尿黃

京門又見下不通照海主尿黃水道不通太陵主目赤

小便如血關元主傷中尿血太陵治小便如血

關元明下治溺海見臍下管療小便赤明見陰交

治臍下熱小便赤氣痛如刀攪作塊如覆杯 陰踠療

尿黃水小腹熱咽乾下云療小便難 小腸俞治小便

赤澁小腸緊急 大谿 關元見貴 白環俞療小便

黃下 小腸俞治小便赤澁淋瀝小腹痛銅 膀胱俞

治小便赤澁遺溺陰生瘡少氣脛寒拘急不得屈伸

上廉治小便難赤黃 太谿見傷寒無汗 兌端見 陰谷

見腹脹 下廉治溺黃 寬門治小便赤黃 關元見臍痛

秩邊見腰痛 氣海 陽綱治小便赤澁見腹脹 下皖

治小便赤

見腹痛

大敦主尿血灸三壯千

小便有五色惟赤白色者多赤色多因酒得之宜服

本事方清心丸

予教人服効

白色乃下元冷宜服補藥著

灸腎俞關元小腸俞膀胱俞等皆要穴也近有患小便出血者人教酒與水煎苦蕒菜根服即愈

治夢遺失精

白濁

虛勞尿精灸第七椎兩旁各三十壯

千

或曲泉百壯虛

勞白濁灸脾俞百壯或

三焦俞

腎俞

章門

各

百壯夢失精小便濁難灸腎俞百壯 夢泄精灸中封

五十 男子夢與人交精泄灸三陰穴五十 失精陰

縮灸中封五十 陰痛溺血精出灸列缺俞五十 失

精五藏虛竭灸曲骨端五十 失精陰縮莖痛灸大赫

三十 失精膝脛痛冷灸曲泉百壯 腰脊冷疼溺濁

灸脾募百壯並 白濁漏精灸大椎骨尾龜骨並中間

共三穴以繩量大椎至尾龜骨折中取中間穴別附 太

衝 中封 地機主精不足千 中極 蠡溝 漏谷

承扶

至陰主小便不利失精

明下同

志室治失精

小便淋瀝

然谷主精溢

大赫同

肱痠不能久立足一寒

一熱

行間治溺難白濁寒疝小腹腫

腎俞治溺血

便濁出精

銅見勞療

膏肓俞治夢失精

見勞

至陰 曲泉

見風勞

中極

明下同

治失精

見淋

志室治下腫失精夢泄

精灸三陰交二七壯夢斷神良

千

虛勞尿精陽陵泉或

陰陵泉隨年壯或十椎十九椎旁三十壯耳聾腰痛失

精食少膝以下清云云當灸京門五十壯十四椎百壯

五藏論曰心有三孔藏精汁三合

千則

人之遺漏其

因於心乎心動則遺漏從之欲免此患要養其心使
不動可也其次則邪念或起必蚤抑之至游居士云
不愁念起只恐覺遲是也服藥鍼灸斯為下矣然猶
愈於不為也

大便不通

大鍾 中竅 石門 承山 太衝 中管 太谿

承筋主大便難

千

崑崙主不得大便 盲俞主大便

乾腹中切痛 石關主大便閉塞氣結心堅滿 承山

見轉筋

太谿

見傷寒無汗

治大便難

銅

大鍾

銅見淋

石關

治大便秘澀

盲俞治大便燥

見腰痛

中注治小腹有

熱大便秘燥不利

太白治腰痛大便難

太衝治足

寒大便秘

石關

膀胱俞療腹痛大便難

明下

大便難

灸七椎旁各一寸七壯

千

又承筋三壯

大便不通

大敦四壯

大便閉塞氣結心堅滿石門百壯

餘見千金

腹中有積大便秘已豆肉為餅置臍中灸三壯即通神

效耆城密允治大便秘

詳見
既効

大小便不通

豐隆主大小便澁難

明同

長強

明下同

小腸俞主大小

便難淋瘕

包盲主瘕閉下重大小便難

水道主三

焦約大小便不通

又云主婦人

營衝四穴主大小便不利

太谿主大便秘尿黃中注浮郤主小腹熱大便

堅

白環俞

見腰脊

扶承

見痔

大腸俞治大小便不利

銅見
腹脹

會陰治不得大小便

見陰痛
下同

浮郤治小腸熱

大腸結

見筋急

膀胱俞療大小便難尿赤

明

交信療

大小便難

一卒傷寒大小便不通予與五苓散而皆通五苓固

利小便矣而大便亦通者津液生故也或小便通而

大便尚不通宜用蜜九道之

必用方婦人老人大便祕用麻子蘇子煮粥食

最佳

小便不禁

遺尿附

承漿主小便不禁

見便黃

關元

又主婦人小便數泄不止

涌泉主

小便數 少府主陰暴痛遺尿

千

關門

中府

甲作委中

神門主遺尿

陰陵泉

陽陵泉主失禁遺尿不自

知 太衝主女遺尿

見症

關門治遺溺善滿

銅

箕門

見淋

通里

見傷寒千同

大敦

見症

膀胱俞

見便赤

太衝

見小

利便不

委中

見腰脊

神門治遺溺

見心煩

陰包治遺溺

不禁

見腰痛

遺溺灸陽陵泉或足陽明各隨年

千

遺

溺失禁出不自知灸陰陵泉隨年

小便失禁灸大敦

或行間七壯

尿床灸臍下橫文七壯婦人遺尿灸橫

骨七壯 小兒遺尿灸臍下寸半隨年又灸大敦三壯

餘見千金

曲泉陰谷陰陵泉復溜

此諸穴斷小便利大佳不損陽氣亦云止遺尿

大便不禁

餘見泄瀉

大腸俞次窳主大小便利 陽綱主大便不節

明同腸鳴

泄注小便赤黃 承扶主尻中腫大便直出陰脬有寒

小便不利 屈骨端主大便泄數小便不利并灸天樞

丹田主泄利不禁小便絞痛 關元療洩痢虛脹小

便難

明

冤門治大便不節

銅

老小大便失禁灸兩足

大指去甲一寸三壯又灸大指歧間各三壯千三里主霍亂遺失

大便不禁病亦悞矣神闕石門丹田屈骨端等皆是穴處宜速灸之予頃患脾泄醫謂有積以冷藥利之大便不禁服鎮靈丹十餘九午夜各數丸而愈今人服此丹三五丸不效則不服是以一勺水救輿薪火也可乎哉

泄瀉
餘見吐瀉

曲泉治泄利四支不舉

銅見症

腹結治腹寒泄利

見臍痛

神闕治泄利不止小兒妳利不絕腹大繞臍痛氣穴

治婦人泄利不止

見月事

陽綱治大便泄利

意舍治

大便秘泄

並見腹脹

梁門治大腸滑泄穀不化

見積氣

關

門治泄利不欲食

見積氣

天樞治泄利食不化

三焦

俞治水穀不化欲泄注

見腹脹

懸樞治水穀不化下利

見積聚

脊中治溫病積聚下利

中膠治腹脹下利食

泄脾俞治泄利

見腹脹

膀胱俞治泄利腹痛

大腸

俞 腎俞治洞洩食不化

見勞瘵

會陽治腹中冷氣洩

利不止

京門治小腹急腫腸鳴洞洩膠樞引痛 三

間治腹滿腸鳴洞洩

然谷治兒洞洩

見口噤

關元療

腹洩不止

明下見賁豚

京門然谷陰陵泉主洞泄不化

千

腎俞

章門主寒中洞泄不化

京門

崑崙主洞

泄體痛

長強主頭重洞泄明下云洞洩不禁

陰陵

泉

隱白主胃中熱暴泄

大腸俞主腸鳴腹脹腫暴

洩

三焦俞

小腸俞

下竅

意舍

章門主腸鳴

腹脹欲泄注會陽主腹中有寒泄注腸澼便血 束骨

主腸澼泄 天樞主冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃

間遊氣切痛若心腹痛而後泄此寒氣客於腸間云云

灸關元百壯服當歸縮砂湯

指

泄瀉宜先灸臍中次

灸關元等穴

飧泄

中竅主腹脹飧泄 下廉治小腹痛飧洩次指間痛脣

乾涎出不覺不得汗出毛髮焦脫肉少氣胃中熱不嗜

食

上廉

見脇痛

治飧洩

陰陵泉主婦人飧泄

見症瘕

素問言春傷於風夏必飧泄苟知傷於風而得之則藥自可治雖不著艾未為害也

本事方云飧泄者食穀不化也春時木旺肝生風邪淫於脾經至夏引冷當風故多飧泄宜芎藭丸芎藭神麴白朮附子等分細末糊圓梧子大每服三五十丸米飲下治脾濕而泄者萬無不中其用芎除濕有理故載于此

溇泄

三陰交治溇洩食不化

銅見腹脹

地機

見水腫

治溇洩

地

機主溇瘕腹痛藏瘕

千

太衝等主溇泄

見痢

予嘗患痺疼既愈而溇利者久之因灸臍中遂不登
溇連三日灸之三夕不登溇若灸溇泄臍中第一三
陰交等穴乃其次也

本事方云一親每五更初必溇痢一次者數月有人云
此名腎泄腎感陰氣而然服五味子散愈

五味子二兩
吳茱萸半兩

細粒綠色者並炒香熟為末每服二錢陳米飲下

其論溘利有理故附載之

予舊患溘利每天曉必如廁人教贖豆附丸服即愈其方不可得也他年再患此只用薑煎附子加豆蔻服愈

痢
餘見瀉

素問言泄痢有五種一曰胃泄飲食不化而色黃胃與脾合故黃也二曰脾泄腹脹而注泄無休又上逆嘔此為寒熱之患也三曰大腸泄食畢腸鳴切痛而

痢白色大腸與肺合故白也四曰小腸泄身瘦而便
膿血小腸與心合心主血也五曰大瘕泄裏急後重
數至圞不能便莖中痛此腎泄也諸家方有二十餘
種此唯言五種蓋舉其綱也必用方亦有赤白痢蠱
之別其大槩則藏府寒也廩丘公所謂諸下悉寒是
也數予治人痢惟與以鎮靈丹無有不效或未效更
加丸數則效矣若蠱利則用栢葉黃連煎服見既效諸
痢惟耆域方用厚朴櫻栗殼末最佳後人又加木香

黃連陳皮等分甘草拌之黃穀葉數片姜棗烏梅水煎予嘗用之驗故載于此然痢本無惡證而有患此而死者或者世醫以痢為熱病多服冷藥故也若其急難亦當灼艾不可專用藥云

復溜主腸辟便膿血泄痢後重腹痛如瘕狀千交信

主泄痢赤白銅漏血太衝曲泉主溏泄痢注下血

小腸俞主泄痢膿血五色重下腫痛丹田主泄痢不禁小便絞痛關元大谿主泄痢不止脾俞主泄

痢不食食不生肌 五樞主婦人赤白裏急瘕瘕 曲

泉治泄水下利膿血

銅見風勞

中膺俞治腸冷赤白痢

明同

膀胱俞療泄痢腹痛

明

脊俞療溫病積聚下痢

銅作

下利

關元療洩痢

見便不禁

小兒痢下赤白秋末脫肛每

廁腹痛不可忍灸十二椎下節間名接脊穴一壯 黃

帝療小兒疳痢脫肛體瘦渴飲形容瘦悴諸藥不差灸

尾翠骨上三寸骨陷間三壯 岐伯云三伏內用桃水

浴孩子午正時當日灸之用青帛拭似見疳蟲隨汗出

神效 小兒伏深冷痢不止灸臍下二寸三寸間動脉

中三壯 婦人水洩痢灸氣海百壯 泄痢食不消不

作肌膚灸脾俞隨年壯 十 泄注五利便膿重下腹痛灸

小腸俞百壯 泄痢不禁小腹絞痛灸石門百壯 三

報

久痢百治不差灸足陽門下一寸高骨上陷中去大指

歧三寸隨年又臍中二三百壯又關元三百 十日 赤

灸

白下灸窮骨多為佳四支不舉多汗洞痢灸大橫隨年

餘見 痢暴下如水云云氣海百壯 指

千金

便血

餘見痢

腸風

復溜

太衝等

並見痢

會陽

見瀉

主便血

千

下廉

幽

門明同

太白

見吐瀉

治洩利膿血

銅

太白治吐洩膿血

腹見腹脹

小腸俞治大便膿血出

明同

下膠治大便下血

腹哀治大便膿血

見腹痛

千又云寒中食不化腹痛

勞宮

見傷寒

治大小便血

陸氏續集驗方治下血不止量臍心與脊骨平於脊

骨上灸七壯即止如再發即再灸七壯永除根本目

觀數人有效予嘗用此灸人腸風皆除根本神效無比然亦須按其骨突處痠疼方灸之不疼則不灸也但便血本因於腸風腸風即腸痔不可分而為三或分為三而治之非也

痔瘻 漏 餘見瘍瘻

長強治腸風下血五種痔瘡蝕下部匿此痔根本是冷

謹冷食房勞

銅與明同

明下云療久痔 會陰治穀道瘙擾

久痔相通者死

千云主痔與陰相通者死

會陽治久痔 小腸俞

治五痔疼

明同

秩邊治五痔發腫

復溜治血痔洩後

腫

飛揚治野雞痔

承山治久痔腫痛

扶承治久

痔尻腫大便秘陰脬有寒小便不利千云療五種痔

瀉鮮血尻腫中腫大便秘小便不利氣海俞療痔病

瀉血

明

飛揚主痔篡傷痛

商丘

復溜主痔血泄

後重

勞宮主熱痔

承筋

承扶

委中

陽谷主

痔痛掖下腫

商丘主痔骨蝕

銅云痔疾骨疽蝕

支溝

章

門主馬刀腫癭

絕骨主癭馬刀掖腫

俠谿

陽輔

銅同

太衝主披下腫馬刀瘻

銅云太衝臨泣治馬刀瘻瘻

天突

章門

天池

支溝王漏

天突

天臑主漏頸痛

長強療下漏

明見痔一千用亭厯子豉作餅灸漏外臺云不可灸頭瘡亭厯氣入腦殺人

灸痔法疾若未深尾閭骨下近穀道灸一穴便可除去

如傳信方先以經年槐枝煎湯洗後灸其上七壯大稱

其驗如本草只以馬藍菜根一握水三碗煎碗半乘熱

以小口瓦器中熏洗令腫退於元生鼠妳根上灸

即不可灸

尖頭恐效遲

如患深用湯洗未退易湯洗令消然後灸覺火

氣通至胃乃效病雖深至二十餘壯永絕根本以竹片
護四邊肉仍於天色寒涼時灸忌毒物

集效

千金灸漏更有數穴

腸風

脊端窮骨

脊骨盡處

名龜尾當中灸三壯治腸風瀉血即

愈須顛倒身方灸得

久冷五痔便血脊中百壯

千翼

何教授湯簿有此疾積年皆一灸除根湯簿因傳此
法後觀灸經此穴療小兒脫肛瀉血蓋岐伯灸小兒

法也後人因之以灸大人腸風瀉血爾蓋大人小兒之病初不異故也五痔便血失屎

迴氣百壯在脊窮骨上赤白下

長強治腸風下血

銅見痔

腸風藥甚衆多不作效何也本草衍義曰腸風乃腸痔苟知其為痔而治之無不效矣若灸腸風長強為要穴云近李倉腸風市醫以杖量臍中於脊骨當臍處灸即愈予因此為人灸腸風皆除根

陸氏方治下血除根

腸癖

復留

見痛

束骨

會陽

見瀉

主腸辟

千

中都治腸辟瘕

疝小腹痛

銅

四滿治腸辟切痛

見積聚

結積留飲辟

囊胃滿飲食不消灸通谷五十壯

千

大腸俞主風腹

中雷鳴大腸灌沸腸辟洩痢食不消化小腹絞痛腰脊

疼強大小便難不能飲食灸百壯三報之諸結積留飲

癖囊胃滿飲食不消通谷五十壯又胃管三百三報之

第十五椎名下極俞主腹中疾腰痛膀胱寒癖飲注下

隨年壯

十翼

會陽主腹中有寒泄注腸辟便血 束骨

主腸辟泄 膺臆主腸鳴泄注 陽綱主大便不節小

便赤黃腸鳴泄注 三焦俞小腸俞下竅意舍章門主

腸鳴腹脹欲泄注 千

腸痛 餘見腸辟

太白主腸痛

甲見
腸鳴

陷谷等主腸痛

千見
腸鳴

商曲治腸

切痛

銅見
積聚

建里療腸中疼嘔逆上氣心痛身腫

明

氣衝治腸中之熱

銅見
上氣

腸痛亦多端若疼甚者乃腸癰急宜服內補十全散

等藥其他宜隨證灸之有老嫗大腸中常若裏急後重甚苦之自言人必無老新婦此奇疾也為按其大腸俞疼甚令歸灸之而愈

腸癰為病小腸重小便數似淋或繞臍生瘡或膿從臍出大便秘出膿血屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血止差

胡權內補十全散治腸癰神效

腸鳴 腹鳴

不容治腹虛鳴

銅見
症癖

三間主胃滿腸鳴

千

胃俞主

腹滿而鳴

明下云
腹中鳴

臍中主腸中常鳴上衝於心

天

樞主腹脹腸鳴氣上衝胃

又主
婦人

陰都主心滿氣逆腸

鳴太白

公孫

大腸俞

三焦俞等

見

主腸鳴

陰交主腸鳴濯濯有如水聲

上廉主腸鳴相追逐

漏谷主腸鳴強欠心悲氣逆

膺腧主腸鳴泄注

陷

谷

溫溜

漏谷

復溜

陽綱主腸鳴而痛下竅主

婦人腸鳴注泄

胃脇脹腸鳴切痛太白主之

甲

三

里

見胃

三間

京門

見瀉

關門

見積氣

三陰交

見腹脹

陷谷一水分

神闕

並見水腫

承滿溫溜三焦俞大腸俞

胃俞

腹脹

天樞

月事

治腸鳴

銅

章門治腸鳴盈盈然

同千

食不化脅痛不得卧煩熱口乾不嗜食胃脇支滿喘息

心痛腰

下經有背脅

痛不得轉側

上廉治腸鳴氣走疰痛

商丘治腹脹腸鳴不便脾虛令人不樂身寒善太息

心悲氣逆

復溜治腹雷鳴

見鼓漲

腎俞療腹痛雷鳴

明見腹痛

承滿療腸鳴腹脹上喘氣逆

下

陽綱療食飲

不下腹中雷鳴腹滿臌脹大便洩消渴身熱面目黃不

嗜食急情

下

千云主腸鳴

見大便不禁

三焦俞療腹脹腸

鳴腸中雷鳴相逐痢下灸承滿五十壯

千

天樞主腹

脹腸鳴氣上衝胃不能久立腹痛濯濯冬日重感於寒則

泄瀉

見泄

食不化嗜食身腫夾臍急腹中雷鳴灸太衝

無限壯數

千見上氣

脫肛

百會療脫肛

明

下云療大人小兒脫肛銅云治小兒脫

肛久不差 岐伯療小兒脫肛瀉血秋深不較灸龜尾

一壯脊端窮骨也 黃帝灸小兒疳痢脫肛 小兒痢

下脫肛

並見痢

小兒脫肛灸頂上旋毛中三壯即入

千

或尾翠骨三壯或臍中隨年 寒冷脫肛灸翠骨七壯

立愈神效臍中隨年

千翼

橫骨百壯或龜尾七壯

窮骨

人有小女患痢脫肛予傳得一方用草茶葉一握薑

七片令煎服而愈然不知其方所自來也後閱坡文

始知生薑咬咀煎茶乃東坡治文潞公痢之方也故

附於此

霍亂轉筋

筋緩急

餘見手足寧

凡霍亂頭痛胃滿呼吸喘鳴窮窘不得息人迎主之千

巨闕

明云療霍亂不識人

關衝

支溝

公孫

陰陵泉主

霍亂

太陰

大都

金門

僕參主厥逆霍亂

太

白主霍亂逆氣

魚際主胃逆霍亂

承筋主霍亂脛

不仁

承筋

僕參

見尸厥

解谿

陰陵泉

見治霍亂

金門

僕參

承山

承筋轉筋霍亂千

承山治

霍亂轉筋大便難

銅

金門治霍亂轉筋

曲泉

見

懸鍾

見膝

陽輔

見膝

京骨

見足

胃俞治筋攣

見腹

脹

僕參

見足

竅陰

見無

至陰

見頭

解谿

見

丘墟

見掖

治轉筋

髀關治筋絡急

銅見

浮郄治小

腸熱大腸結股外脛筋急髀樞不仁

曲池治筋緩捉

物不得挽弓不開屈伸難風臂肘細無力

中瀆治寒

氣客於分肉間痛攻上下筋痺不仁

承筋治寒搏轉

筋支腫大便難脚腠痠重引小腹痛

委中

見脚

附

陽

承山

見腰脚

療筋急

明下

張仲文灸脚筋急

見腰脚

歧伯療脚轉筋發不可忍者灸脚踝上一壯內筋急灸

內外筋急灸外

解谿主膝重脚轉筋濕痺

千

竅陰

主四支轉筋

大淵主眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中相

引痛

丘墟主脚急腫痛戰掉不能久立附筋足攣

委中委陽主筋急身熱

肝俞主筋寒熱瘕筋急手相

引心俞

肝俞主筋急手相引轉筋入腹痛欲死者

使四人捉手足灸臍左邊二寸十四壯

備急

千云臍上

一寸十四壯轉筋灸涌泉六七壯千轉筋四厥灸乳根

黑白際一壯 若手足厥冷三陰交二七壯 霍亂已

死有暖氣者承筋七壯起死人 又鹽內臍中灸二七

壯 腰背不便轉筋急痺筋攣二十一椎隨年轉筋在

兩臂及胷中灸手掌白肉際七壯 又灸亶中中府巨

闕胃管尺澤并治筋拘頭足皆愈 腹脹轉筋臍上一

寸二七壯 人有身屈不可行亦有膝上腫疼動不得

予為灸陽陵泉皆愈已救百餘人矣神效無比

有吐瀉轉筋者

予教灸水
分即止

轉筋十指攣急不得屈伸灸脚外踝骨上

七壯

餘見千金

霍亂吐瀉

餘見轉筋

凡霍亂泄出不自知先取太谿後取太倉之原千 三

里主霍亂遺矢失氣 期門主霍亂泄注 尺澤主嘔

泄上下出脇下痛 太白主腹脹食不化喜嘔泄有膿

血 關衝治霍亂胃中氣噎不嗜食臂肘痛不舉銅

人迎治吐逆霍亂胃滿喘呼不得息 期門治胃中煩

熱賁豚上下目青而嘔霍亂洩利腹堅硬大喘不得卧

脇下積氣 上腕治霍亂吐利身熱汗不出 隱白治

吐洩

見腹脹

中腕治霍亂出洩不自知 支溝 天樞

治嘔吐霍亂

見臍痛

太白治氣逆霍亂腹痛又吐洩膿

血

見腹脹

陰郄治心痛霍亂胃滿 上管治霍亂心痛

不可卧吐利

明

巨闕治胃脇滿霍亂吐利不止困頓

不知人

下

吐逆霍亂吐血灸手心主五十壯千凡霍亂

先心痛及先吐灸巨闕七壯若先腹痛太倉二七壯若

先下利灸大腸募

臍旁二寸

男左女右若吐下不禁兩手脉

疾數灸蔽骨下三寸又臍下三寸各七十壯若下不止

太都七壯若泄利傷煩欲死慈宮二七壯

霍亂吐瀉尤當速治宜服來復丹鎮靈丹等藥以多

為貴尤宜灸上管中腕神闕關元等穴若水分穴尤

不可緩蓋水穀不分而後泄瀉此穴一名分水能分

水穀故也或兼灸中管穴須先中管而後水分可也

嘔吐 又見喘嗽

胃俞主嘔吐筋攣食不下千 商丘主脾虛令人病寒

不樂好太息多寒熱喜嘔 商丘 幽門 通谷主喜

嘔 陽陵泉主嘔宿汗心下澹澹 天容主欬逆嘔沫

曲澤主逆氣嘔涎 維道主嘔逆不止 大鍾 太

谿主煩心滿嘔 絕骨主病熱欲嘔 俞府明下云不下食

靈墟 巨闕 率谷 神藏主嘔吐胃滿 胃俞 腎

俞 石門 中庭等見反胃 少商 勞宮主嘔吐 隱

白主鬲中嘔吐不欲食 魂門 陽關主嘔吐不住多

涎 巨闕 胃堂主吐食 鬲俞主吐食又灸章門

胃管 魚際療膈虛食欲嘔身熱汗出唾嘔吐血唾血

明

中庭見反胃療嘔吐明云門見上療嘔逆 神藏

靈墟治嘔吐胃滿

銅見胃脇滿

承光

見頭痛

大都

見腹滿

治

嘔吐

太衝治嘔逆發寒

見症

大鍾治嘔逆多寒

見淋

勞宮

見傷寒

治氣逆嘔噦

維道治嘔逆不止三焦不調

水腫不嗜食

上膠治嘔逆

鬲關治嘔噦多涎唾

見背

痛

率谷治嘔吐不止

見痰

肺俞治上氣嘔吐

見上氣

玉堂治嘔吐寒痰上氣 心俞治嘔吐不下食

見狂走

中庭

見胃滿

膺府

見喘

意舍

見腹脹

治嘔吐

鬲俞治欬

逆嘔逆鬲胃

明作上

寒痰食飲不下胃滿支腫脇痛腹脹

胃腕暴痛

膽俞治嘔則食無所出

見腹脹

魄戶治嘔

吐煩滿

見上氣

臄中治吐涎

太谿治嘔吐口中如膠

善噫

顙顙治小兒嘔吐涎沫

瘕脉治小兒嘔吐洩

利

並見小兒瘕瘕

築賓

見狂

少海治嘔吐涎沫

廉泉療喘

息嘔沫

明見少氣

築賓療嘔吐不止

幽門療善吐食飲

不下兼唾多吐涎乾噦嘔沫下上管療嘔吐食不下

腹脹氣滿心忪驚悸時吐嘔血腹疔痛痰多吐涎小

兒吐乳灸中庭一壯 粥食湯藥皆吐不停灸間使干

嘔乾吐逆嘔不得食灸心俞百壯或胃堂百壯或巨闕

五十 嘔吐宿汁吞酸灸日月百壯三報或鹽半斤炒

故帛裹就熱熨痛處主嘔吐若心腹痛而嘔此寒熱客

於腸胃云云灸中腕指三焦俞主飲食吐逆干見腹脹

隱白療嘔吐明太白治嘔吐 三焦俞治吐逆並見腹脹

乾嘔

極泉

俠白治心痛乾嘔煩滿

銅

通谷療乾嘔無所

出又治勞食飲隔結

明

膽俞療胃脇支滿嘔無所出

口舌乾飲食不下

幽門療乾噦

下見吐

乾嘔不止粥

食湯藥皆吐不停灸手間使三十壯若四厥脉沈絕不

至灸便通此起死法

千

乾嘔灸心主尺澤亦佳又灸

乳下一寸三十壯

霍亂乾嘔間使七壯不差更灸

千金言生薑乃嘔家聖藥有此疾者蚤上宜多用生

薑泡湯服或煨或生嚼或取自然汁入酒服皆效

隱白主腹滿喜嘔干乾嘔灸心主尺澤佳又乳下一寸

三十壯凡噦令人惋恨

承漿七壯如麥大又臍下四指七壯卒噦亶中中府胃管各數

十壯尺澤

巨闕七壯

噫

蠡溝主數噫恐悸氣不足

十

陷谷主腹大滿喜噫

鳩尾主噫喘胃滿欬嘔

少海主氣逆呼吸噫噦嘔

勞宮主氣逆噫不止

欬唾噫善欬氣無所出先取三

里後取太白章門 大敦主噦噫又灸石關 太谿見吐

治善噦

銅

蠡溝治數噦

見疝

神門治數噦恐悸

見心煩

陷谷

見水腫

期門治產後善噦

見心痛

太淵治噦氣

上逆

少商治煩心善噦心下滿汗出而寒欬逆 太

淵治善噦嘔

見胃痺

溫溜治傷寒噦逆噦鬲中氣閉

寒灸腋下聚毛下附肋宛宛中五十壯千噦噦嘔逆灸

石關百壯

傷寒嘔噦

諸噦

巨闕主傷寒煩心喜嘔千 甲云主心腹脹噫煩熱善嘔

鬲中不利 間使主熱病煩心喜噦胃中澹澹 溫溜

主傷寒寒熱頭痛噦衄 百會主汗出而嘔瘕 商丘

主寒熱好嘔 大椎主傷寒熱盛煩嘔 腎俞主頭身

熱赤欲嘔千並 勞宮主熱病煩滿欲嘔噦甲 曲澤主

傷寒逆氣嘔唾千

必用方論噦者俗云克逆也鍼灸者當以此求之

若氣自腹中起上築咽喉逆氣連屬不能出或至數十

聲上下不得喘息此由寒傷胃腕腎氣先虛逆氣上乘
於胃與氣相併不止者難治謂之噦宜茱萸丸灸中腕
關元百壯未止灸腎俞百壯

指

唾

中府治欬唾濁涕

銅見肺氣

庫房治多唾濁沫膿血 周

榮治欬唾稠膿

並見胃脅滿

少商治腹滿唾沫

見瘡

百會

癰治唾沫

石關治多唾嘔沫

明下

庫房治肺寒欬嗽

唾膿

見逆氣

幽門

見同

治嘔沫吐涎喜唾

銅

石關治脊

強不開多唾

日月治多唾

見悲愁

天井治心胃痛效

嗽上氣吐膿不嗜食 紫宮治吐血及唾如白膠

明

曲澤主傷寒逆氣嘔唾千

名醫賈祐錄云積主藏病聚主府病積者是飲食包
結不消聚者是伏痰結而不化痰伏在上鬲主頭目
眩痛多自涎唾或致潮熱用平胃散烏金散治之其
論有理故載之

胃痛

寒熱

魚際療胃氣逆

明

分水治胃脹不調

見腹痛

銅云胃虛

脹不嗜食

鬲俞治胃腕暴痛

銅見嘔吐

下管治腹胃不

調腹痛

明見腹堅

腎俞主胃寒脹

千見食多

胃俞治胃中寒

銅見腹脹

水分治胃虛脹

見水腫

三里治胃中寒心腹脹

滿胃氣不足惡聞食臭腸鳴腹脹食不化

明下同

下廉

見驗洩

懸鍾治胃熱不嗜食

心俞療胃中弱食不下

明下

太淵

千見心痛

療胃氣上逆唾血

治胃補胃胃俞百

壯胃寒不能食食多身瘦腸鳴腹滿胃脹胃熱三里三

十壯反胃食即吐上氣灸兩乳下各一寸

以差為期

又臍上

一寸二十壯又內踝下三指稍斜向前穴三壯

外臺云一指

千翼

反胃

凡食飲不化入腹還出先取下管後取三里瀉之章

門主食飲不化入腹還出

見不嗜食

中庭

中府主鬲寒

食不下嘔吐還出又主嘔逆吐食不得出中庭療胃

脇支滿心下滿

銅明同下

食不下嘔逆吐食還出

三里療

胃氣不足反胃

胃俞

見不能食

療吐食

意舍療吐食不

留住

下見背痛

吐逆食不住胃管百壯

十

吐嘔逆不得下

食今日食明日吐灸鬲俞百壯

有人久患反胃予與鎮靈丹服更令服七氣湯遂能
立食若加以著艾尤為佳也有老婦人患反胃飲食
至晚即吐出見其氣繞臍而轉予為點水分氣海并
夾臍邊兩穴他歸只灸水分氣海即愈神效

食不下

不化

魂門治飲食不下腹中雷鳴

銅

三焦俞治吐逆飲食

不下

見腹脹

胃倉

意舍

見腹脹

鬲關治食飲不下

見背

痛

胃俞主嘔吐筋攣食不下

千

大腸俞

周榮主

食不下喜飲

中庭

中府主鬲寒食不下

見反胃

陽

綱期門

少商

勞宮主飲食不下

三焦俞主傷

寒頭痛食不下

心俞治胃弱食飲不下

明下

鬲俞治

鬲寒食飲不下腹脇滿胃弱食少嗜卧怠惰不欲動身

溫不能食千云主吐食

見嘔

陽綱治食不下腹中雷鳴

大小便下節黃水

明

紫宮

見煩心

中庭

見反胃

膽俞

見嘔治飲食不下

三里

見胃

大腸俞

三陰交

並見腹脹

下腕

見腹痛

三焦俞

懸樞

見瀉

梁門

見積氣

治穀不化

天樞

見瀉

志室

見脊痛

腎俞

見勞

治食不化

腹哀治

寒中食不化

三焦俞治水穀不消腹脹腰痛吐逆

明

腹哀

銅同

太白

見瀉

主食不化

十

凡食飲不化入腹

還出先取下管後取三里瀉之石門主不欲食穀入

不化天樞厲兌內庭主食不化不嗜食夾臍痛

章門主食飲不化

見不嗜食

上管

中管主寒中傷飽

食飲不化

中庭治胃脇滿食不下

見反胃

胃管 三

焦俞主小腹積聚堅大如盤胃脹食不消

千

志室

明見

腹療食不下

太白

公孫

見腹脹

主食不化

中府

胃倉承滿

見腹脹

魚際

見腹脹

周榮

見胸滿

治食不下

中管

腹脹

三陰交

見腹脹

治食不化

不能食

然谷治腦痛不能食

銅見痰

豐隆主不能食

中極主

飢不能食 胃俞主嘔吐筋攣食不下不能食 維道

主三焦有水氣不能食 鬲俞主傷寒嗜卧怠惰不欲

動身濕不能食 同銅 石門主不欲食穀入不化 率谷

主醉酒風熱發不能飲食嘔吐 甲 少商療不能食腹

中氣滿喫食無味 明 分水 見腹 療不能食 胃俞療

煩滿吐食腹脹不能食下云療胃中寒氣不能食胃脇

滿身瘦不能食胃滿鬲上逆氣悶熱灸大腸俞二七壯

小兒減之 平 三里療腹滿不能食胃氣不足反胃 明

不能飲食見腸辟藏府積聚及飲食不消見寒熱涌泉
主心痛不嗜食咽中痛不可內食見虛勞脾俞胃俞治
不嗜食

不嗜食

凡不嗜食刺然谷多見血使人立飢千 隱白見吐 然

谷 脾俞 內庭主不嗜食 天樞 厲兌 內庭主

食不化不嗜食夾臍急 中封主身黃有微熱不嗜食

章門主食飲不化入腹還出熱中不嗜食苦吞而聞

食臭傷飽身黃酸疼羸瘦 肺俞治上氣嘔吐支滿不

嗜食

銅

胃俞脾俞治腹痛不嗜食

見腹脹

地機

陰

陵泉

水分

並見水腫

幽門

見胃痛

小腸俞

見脚氣

治不嗜

食

下腕治六府氣寒不嗜食

見腹痛

下廉

見飧洩

懸

鍾治胃熱不嗜食

見膝摩

陰譙療病飢不欲食

明

懸

鍾療腹滿中焦客熱不嗜食

明下

又云心腹脹滿胃熱不

嗜食

陽綱

見腸鳴

療不嗜食

分水治胃虛脹不嗜食

銅

不嗜食有數端有三焦客熱不嗜食有胃熱不嗜食

有胃寒不嗜食有六府氣寒不嗜食固當隨證用藥
治之而針灸者亦當知補瀉之法可也

史記陽虛侯病甚衆醫皆以為感太倉公診脉以為
痺根在右脇下大如覆杯令人喘逆氣不能食病得
之內即以火齊粥且飲六日氣下即令更服圓藥出
入六日病已然則人之不能食亦有患痺而得者槩
曰胃有寒熱則不可也

扁鵲曰凡人心風灸心俞肝俞主心風腹脹滿食不消

化四支羸露不欲食

見中風

曲泉主不嗜食見無子

食氣無味

三里治食氣惡聞食臭

見胃

大杼治食氣

百會

見風

癰

少商

見不能食

療喫食無味

明

凡身重不得食食無

味心下虛滿時時欲下喜卧皆針胃管太倉服建中湯及平胃丸

有鑽胃丸溫中開胃病人覩飲食不得三五服即思食破故紙半兩肉苁蓉四枚為末蒸棗肉丸梧子大

空心米飲三十丸

食多

脾俞治食飲多身瘦

銅見腹脹

腎俞療食多身瘦

明下見勞

胃俞 腎俞主胃中寒脹食多身瘦 脾俞大腸俞主

食多身瘦

見腹脹

舍姪偶食罷即飢再食又飢自碎生薑濃泡二碗服

愈

瘧

脾寒

千金云夫瘡皆生於風夏傷於暑秋為瘡

瘡素問同瘡云瘡

猶老也亦瘦也楊上善云二日一發為瘡瘡其說與素問千金異

瘡有數名先寒後

熱曰寒瘡先熱後寒曰溫瘡熱而不寒曰痺瘡多寒

曰牡瘡久不差曰勞瘡

久不斷曰老瘡

時行後變成瘡曰瘡

瘡病結為癰疽曰瘡母以至肝肺脾腎心胃亦皆有

瘡或每日發或間日發或作稍益晏或作日益早素

問千金等方論之詳矣治瘡之方甚多惟小金丹為

最佳予嘗以予人皆效然人豈得皆有此藥哉此灸

之所以不可廢也鄉居人用旱蓮草推碎實在手掌
上一夫四指間也當兩筋中以古文鏡壓之繫之以故帛
未久即起小泡謂之天灸尚能愈瘡況於灸乎故詳
著之

諍喜治溫瘡寒瘡明下云療瘡久不愈 腰俞 中管

治溫瘡痂瘡 鬲俞見瘡 命門見頭疼 太溪見欬逆 療瘡

瘡 陰踰治暴瘡 上廉治寒瘡 三間治瘡寒熱瘡

口乾身熱喘目急痛 至陰治瘡發寒熱頭重煩心下

液門 合谷 陷谷 天池治寒熱瘡 偏厯治

發寒熱瘡久不愈目視眊眊 大椎治瘡久不愈

少府治瘡久不愈者煩滿少氣悲恐畏人臂酸掌熱

手握不伸 陶道治瘡寒熱洒淅 命門治寒熱瘡

瘡腰腹相引痛

足臨泣治瘡日西發

千同銅云
治瘡日發

療

小兒瘡久不愈灸足大指次指外間陷中各一壯

並下

太谿

見心痛

照海

中渚治久瘡

丘墟治久瘡振寒

同千

陷谷治瘡

中封治瘡色蒼蒼

千云
太息

振寒小腹

腫食快快 繞臍痛足逆冷不嗜食身體不仁 液門

治痲瘧寒熱目眩頭痛暴得耳聾 腕骨治痲瘧頭痛

煩悶 商陽治寒熱痲瘧口乾明下云治瘧口乾 譙

譙

見肩背痛

中腕

白環俞治溫瘧

見腰脊

上髎

偏歷

治寒熱瘧 三間治寒瘧唇焦口乾氣喘 脾俞治痲

瘧寒熱

有人患久瘧諸藥不效或教之以灸脾俞即愈更一

人亦久患瘧聞之亦灸此穴而愈蓋瘧多因飲食得

之故灸脾俞作效

內庭

厲兌

面腫

公孫治寒瘧不嗜食

京骨治瘧寒

熱喜驚不欲食

明下同

神門治瘧心煩甚欲得飲冷惡

寒則欲處溫中咽乾不嗜食

合谷

陽谿

後谿

陽池

陰都治身寒熱瘧

明下同云瘧瘧

病心下煩滿氣逆

天樞治寒瘧

列缺治寒瘧嘔沫善笑縱脣口

明下同云瘧瘧面

色不定

少商治瘧瘧振寒腹滿

明下有煩心善噦

唾沫脣乾引

飲不下膨膨手攣指痛寒慄鼓頷喉鳴

經渠治瘧寒

熱胃背拘急胃滿膨膨

明同

大椎腰俞治溫瘧瘧瘧

明同

大杼療瘧頸項強不可俛仰頭痛振寒 前谷 風

池

神道

見頭痛

百會治瘧瘧瘧上星治瘧瘧振寒熱汗

不出

偏歷主風瘧汗不出

千

少澤

明云頭痛銅云寒熱

復

溜

崑崙主瘧寒汗不出

銜陽主瘧先寒洗淅甚久

而熱熱去汗出

然谷

崑崙主瘧多汗

甲云主瘧

多汗腰痛不可俛仰目如脫項如拔

列缺

後谿

少澤

前谷主瘧寒熱

太泉

太谿

經渠主瘧欬

逆心悶不得卧寒熱 大陵 腕骨 陽谷 少衝主

乍寒乍熱瘧 天樞主瘧振寒熱盛狂言 太鍾主瘧

多寒少熱 甲云瘧悶嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒

厥足熱 商丘主寒瘧腹痛 少海主瘧背振寒 甲

云項痛引肘掖腰痛少腹四支不舉 陽谿主瘧甚苦

寒欬嘔沫 厲兌 內庭主瘧不嗜食惡寒 少商主

瘧振慄鼓頤 商丘 神庭 上星 百會 完骨

風池 神道 掖門 前谷 光明 至陰 大杼主

痰癰熱 陰都 少海 商陽 三間 中渚主癰身

熱 列缺主癰甚熱 陽谷主癰脇痛不得息 俠谿

主癰足痛 衝陽 束骨主癰從脚脢起 陽谷主癰

脇痛不得息 飛揚主狂癰頭眩痛癰反折 溫留主

癰面赤腫 天井主癰食時發心痛悲傷不樂 天府

主癰病 謔謔 支正 小海主風癰 三里 陷谷

俠谿 飛揚主痰癰少氣

大附子一枚炮末薑兩半取自然汁丸如小豆大每

十五丸空心熱酒吞下老少加減川客治瘧只二三服皆愈云兼治脾胃愈於薑附湯故附此

脾疼

餘見心腹痛

府舍治疝癖脾中急痛循脅上下搶心腹滿積聚厥氣

兩乳

銅

商丘治脾虛令人不樂

見腸鳴
千見吐

三陰交治

脾病身重

見腹
脹

予嘗久患脾疼服治脾藥反膨脹不得已依耆域方用麴裹火炮蓬莪茂朮水與酒醋煎服立愈已而告

人人亦云高良薑末米飲調服亦作效後鄭教授傳
一方云草果延胡索苓脂并沒藥酒調三兩錢一似
手拈却草果子五苓脂四味等分為末此亦平穩藥
也有此疾者宜服之或不吐不瀉心中疼甚日輕夜
甚者用乾鹽梅并茶煎服神效 若灸者宜上管中管
下管脾俞三陰交等穴

鍼灸資生經卷三